

INDICATEURS DU SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS – EDSC-III

Taux de mortalité infanto-juvénile	Probabilité de décéder entre la naissance et l'âge de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (pour la période 0-4 ans avant l'enquête)		144
Taux de mortalité infantile	Probabilité de décéder entre la naissance et le 1 ^{er} anniversaire, pour 1 000 naissances vivantes (pour la période 0-4 ans avant l'enquête)		74
Insuffisance pondérale	Enfants de moins de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale (%)		18
Retard de croissance	Enfants de moins de cinq ans souffrant de retard de croissance (%)		32
Émaciation	Enfants de moins de cinq ans souffrant d'une émaciation (%)		5
Utilisation de l'eau salubre	Pourcentage de la population qui utilise une source d'eau salubre pour boire ¹		53
Utilisation des sanitaires	Pourcentage de la population disposant de latrines améliorées ou chasse d'eau		93
Fréquentation scolaire	Proportion des enfants atteignant le niveau 5 ²		96
Taux net de scolarisation primaire	Enfants de l'âge scolaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire (%)		78
Taux d'alphabétisation	Pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus qui sait lire un texte court et simple lié à la vie quotidienne	Homme :	82
		Femme :	65
Soins prénatals	Femmes de 15-49 ans ayant consulté au moins une fois durant la grossesse du personnel de santé (%) ³		83
Soins à la naissance de l'enfant	Naissances dont la mère a accouché avec l'assistance de personnel de santé (%)		62
Poids à la naissance < 2,5 kg	Naissances vivantes qui pèsent moins de 2 500 grammes (%) ⁴		12
Consommation du sel iodé	Ménages qui consomment du sel iodé d'une manière adéquate (%)	15 ppm ou plus	88
Compléments de vitamine A	Enfants de 6-59 mois ayant reçu un supplément de vitamine A au cours des 6 derniers mois (%)		38
Compléments de vitamine A	Mères qui ont reçu un supplément de vitamine A au cours des deux premiers mois après l'accouchement		28
Cécité crépusculaire	Femmes qui souffraient de cécité nocturne durant la dernière grossesse (%)		6
Taux d'allaitement exclusif	Enfants de moins de 6 mois qui reçoivent exclusivement le sein (%)		24
Taux d'allaitement continu	Enfants de 12-15 mois qui sont allaités (%)		83
Taux d'allaitement continu	Enfants de 20-23 mois qui sont allaités (%)		29
Alimentation de complément	Proportion des enfants 6-9 mois recevant alimentation de complément		79
Vaccin du DTCoq	Enfants de 12-23 mois vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq) (%)		65
Vaccin de la rougeole	Enfants de 12-23 mois vaccinés contre la rougeole (%)		65
Vaccin de la polio	Enfants de 12-23 mois vaccinés contre la poliomyélite (%)		67
Vaccin du BCG	Enfants de 12-23 mois vaccinés contre la tuberculose (%)		86
Vaccination antitétanique	Femmes ayant reçu deux doses ou plus de vaccin antitétanique au cours de la grossesse (%)		53
Prévalence de la diarrhée	Enfants de moins de cinq ans ayant souffert de la diarrhée au cours des deux dernières semaines (%)		16
Utilisation de la TRO	Enfants de 0-59 mois qui avaient la diarrhée durant les deux dernières semaines et qui ont été traités avec une SRO ou une solution préparée à la maison (%)		24
Prévalence des IRA	Enfants de moins de cinq ans ayant souffert de symptômes d'IRA au cours des deux dernières semaines (%)		11
Traitement des IRA	Enfants de 0-59 mois qui avaient une IRA durant les deux dernières semaines et qui ont été conduits à un centre de santé ou auprès d'un agent de santé (%)		40

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES – EDSC-III

Résidence des enfants	Enfants de 0-14 ans vivant dans des ménages mais sans un parent biologique (%)	15	
Orphelins dans les ménages	Enfants de 0-14 ans orphelins vivant dans des ménages (%)	9	
Possession de moustiquaire	Ménages possédant au moins un moustiquaire (%)	20	
Utilisation des moustiquaires par les enfants	Enfants de moins de 5 ans qui ont dormi sous une moustiquaire la nuit précédant l'enquête (%)	12	
Connaissance des moyens de prévention du VIH	Femmes qui ont déclaré qu'ou pouvait éviter le VIH en ayant des rapports sexuels avec seulement un partenaire qui n'a pas d'autre partenaire et en utilisant un condom au cours de chaque rapport sexuel (%)	62	
Connaissance de la transmission du VIH	Femmes qui ont identifié deux idées erronées concernant le sida (%) ⁵	28	
Connaissance de la transmission du VIH de la mère à son enfant	Femmes qui pensent que le VIH peut être transmis de la mère à son enfant durant la grossesse (%)	60	
	Femmes qui pensent que le VIH peut être transmis de la mère à son enfant durant l'accouchement (%)	49	
	Femmes qui pensent que le VIH peut être transmis de la mère à son enfant durant l'allaitement (%)	47	
Population testée pour le VIH	Pourcentage de femmes et d'hommes ayant effectué le test du VIH (%) :	- Femmes :	21
		- Hommes :	16
		- Ensemble :	16
Séroprévalence du VIH	Taux de séroprévalence du VIH (femmes et hommes de 15-49 ans)	- Ensemble :	5,5
		- Femmes :	6,8
		- Hommes :	4,1

¹ Eau du robinet ou de puits protégé

² Basé sur les enfants de droit

³ Pour la dernière naissance au cours des cinq années précédant l'enquête

⁴ Pour les enfants pour lesquels on ne dispose pas du poids déclaré à la naissance, on suppose que la proportion de faible poids à la naissance est la même que celle que l'on trouve dans chaque catégorie de poids parmi les enfants pour lesquels on connaît le poids.

⁵ Femmes rejetant les deux idées erronées les plus courantes (transmission par des moyens surnaturels et par les moustiques) et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida.