

Les estimations obtenues à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte et de l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part de l'enquêtrice ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie des données. Bien que des dispositions particulières aient été prises pour minimiser ce type d'erreur pendant la mise en œuvre de l'EDS-MICS 2011, il est difficile d'éviter et d'évaluer toutes les erreurs de mesure.

Par contre, les erreurs de sondage peuvent être évaluées statistiquement. L'échantillon sélectionné pour l'EDS-MICS 2011 n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons de même taille qui peuvent être sélectionnés dans la même population avec le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement choisi. L'erreur de sondage est une mesure de cette variabilité entre tous les échantillons possibles. Bien que cette variabilité ne puisse pas être mesurée exactement, elle peut être estimée à partir des données collectées.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur de sondage d'un paramètre (moyenne, proportion ou taux) ; elle est la racine carrée de la variance du paramètre. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels devrait se trouver la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance. Par exemple, la vraie valeur d'un paramètre se trouve dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.

Si l'échantillon avait été tiré d'après un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer les erreurs de sondage. Cependant, l'échantillon de l'EDS-MICS 2011 étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, des formules plus complexes ont été utilisées. Un programme SAS a été utilisé pour calculer les erreurs de sondage suivant la méthodologie statistique appropriée. Ce programme utilise la méthode de linéarisation (Taylor) pour des estimations telles que les moyennes ou proportions, et la méthode de Jackknife pour des estimations plus complexes telles que l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r = y/x$, avec y la valeur du paramètre pour l'échantillon total, et x le nombre total de cas dans l'ensemble (ou sous-ensemble) de l'échantillon. La variance de r est estimée par:

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_{h-1}} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}, \text{ et } z_h = y_h - rx_h$$

- où h représente la strate qui va de 1 à H ,
 m_h est le nombre total de grappes tirées dans la strate h ,
 y_{hi} est la somme des valeurs pondérées du paramètre y dans la grappe i de la strate h ,
 x_{hi} est la somme des nombres pondérés de cas dans la grappe i de la strate h , et
 f est le taux global de sondage qui est négligeable.

La méthode de Jackknife dérive les estimations des taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal, et calcule les variances de ces estimations avec des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut *une* grappe dans les calculs des estimations. Ainsi, des sous-échantillons pseudo-indépendants ont été créés. Dans l'EDS-MICS 2011, il y a 578 grappes non-vides. Par conséquent, 578 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux r est calculée de la façon suivante :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

- où r est l'estimation calculée à partir de l'échantillon principal de 578 grappes,
 $r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 577 grappes ($i^{\text{ème}}$ grappe exclue),
 k est le nombre total de grappes.

Il existe un deuxième indice très utile qui est la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS) ou effet de grappe : c'est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Cet indice révèle dans quelle mesure le plan de sondage qui a été choisi se rapproche d'un échantillon aléatoire simple de même taille : la valeur 1 de la REPS indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un échantillon aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1 indique un accroissement de l'erreur de sondage dû à un plan de sondage plus complexe et moins efficace au point de vue statistique. Le logiciel calcule aussi l'erreur relative et l'intervalle de confiance pour chaque estimation.

Les erreurs de sondage pour l'EDS-MICS 2011 ont été calculées pour certaines des variables les plus intéressantes. Les résultats de l'enquête sont présentés dans cette annexe pour le Cameroun, pour les deux grandes villes Douala et Yaoundé ensemble, pour les autres villes, pour l'ensemble du milieu urbain et le milieu rural séparément, et pour chacun des 12 domaines d'étude. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion ou taux) et la population de base sont présentés dans le tableau B.1. Les tableaux B.2 à B.18 présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non-pondérés (N) et pondérés (N'), la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95% ($M \pm 2ET$) pour chaque variable. L'effet du plan de sondage (REPS) est non-défini quand l'écart type du sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1). Dans le cas de l'indice synthétique de fécondité, le nombre de cas non-pondérés n'est pas pertinent, car la valeur non-pondérée de femmes-années d'exposition au risque de grossesse n'est pas connue.

L'intervalle de confiance est interprété de la manière suivante : pour la variable *Enfants nés vivants*, par exemple, l'EDS-MICS 2011 a donné un nombre moyen d'enfants nés vivants de 2,727 pour l'ensemble des femmes, auquel correspond une erreur-type de 0,032 enfants. Dans 95 % des échantillons de taille et caractéristique identiques, la valeur réelle du nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes âgées de 15 à 49 ans se trouve donc entre $2,727 - 2 \times 0,032$ et $2,727 + 2 \times 0,032$, soit entre 2,662 et 2,792.

Pour l'échantillon national de femmes, la moyenne de la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS) calculée pour l'ensemble des estimations est de 1,54 ; ce qui veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur de sondage est multipliée en moyenne par un facteur de 1,54 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappes et à plusieurs degrés).

Tableau B.1 Liste des variables sélectionnées pour le calcul des erreurs de sondage. Cameroun 2011

Variable	Estimation	Population de base
FEMMES		
Résidence urbaine	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Alphabétisation	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Aucun niveau d'instruction	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Taux net de fréquentation scolaire	Ratio	Population des ménages [7-12] ans
Jamais mariée/ Jamais en union	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Actuellement mariée/en union	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Mariée avant l'âge de 20 ans	Proportion	Toutes les femmes de 20-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Toutes les femmes de 20-49 ans
Actuellement enceinte	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Enfants déjà nés	Moyenne	Toutes les femmes de 15-49 ans
Enfants survivants	Moyenne	Toutes les femmes de 15-49 ans
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	Moyenne	Toutes les femmes de 40-49 ans
Connait une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Connait une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
A déjà utilisé une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement des condoms	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement des injectables	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement la méthode du rythme	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
A utilisé une source du secteur public	Proportion	Utilisatrices actuelles de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou +	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Toutes les femmes de 15-49 ans
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	Proportion	Femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années
Accouchement assisté par un prestataire formé	Proportion	Naissances ayant eu lieu 1-59 mois avant l'enquête
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Traités avec des SRO	Proportion	Enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines
Traitement médical recherché	Proportion	Enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines
Carnet de vaccination montré	Proportion	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin du BCG	Proportion	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin du DTCQ (3 doses)	Proportion	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	Proportion	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la rougeole	Proportion	Enfants de 12-23 mois
A reçu tous les vaccins	Proportion	Enfants de 12-23 mois
Taille pour Age (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Poids pour Taille (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Poids pour Age (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59 mois)	Proportion	Tous les enfants de 6-59 mois testés
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans testées
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans mesurées
A eu 2 partenaires sexuels ou + dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	Proportion	Femmes 15-49 avec 2 partenaires sexuels ou+ dans les 12 derniers mois
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	Proportion	Femmes célibataires de 15-24 ans
Sexuellement actives 12 derniers mois parmi jeunes	Proportion	Femmes célibataires de 15-24 ans
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15-49 ans
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/sida	Proportion	Toutes les femmes ayant entendu parler du VIH/sida
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale ¹	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité post-néonatale	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité infantile ¹	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité juvénile ¹	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité infanto-juvénile ¹	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Rapport de mortalité maternelle ²	Taux	Années d'exposition au risque pour les sœurs de l'enquêtées
Prévalence du VIH parmi toutes les femmes 15-49	Proportion	Toutes les femmes interviewées et DBS testé au laboratoire
HOMMES		
Résidence urbaine	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
Alphabétisation	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
Aucun niveau d'instruction	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
Jamais marié/ Jamais en union	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
Actuellement marié/en union	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Tous les hommes de 20-49 ans
Connait une méthode contraceptive	Proportion	Hommes actuellement en union de 15-49 ans
Connait une méthode moderne	Proportion	Hommes actuellement en union de 15-49 ans
A déjà utilisé une méthode contraceptive	Proportion	Hommes actuellement en union de 15-49 ans
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Hommes actuellement en union de 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou+	Proportion	Hommes actuellement en union de 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Tous les hommes de 15-49 ans
A eu 2 partenaires sexuelles ou + dans les 12 derniers mois	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	Proportion	Hommes 15-49 ans avec 2 partenaires sexuelles ou + dans 12 derniers mois
Abstinence parmi les jeunes (jamais de rapports sexuels)	Proportion	Hommes de 15-24 ans
Sexuellement actifs 12 derniers mois parmi jeunes célibataires	Proportion	Hommes célibataires de 15-24 ans
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	Proportion	Tous les hommes de 15-49 ans
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/sida	Proportion	Tous les hommes ayant entendu parler du VIH/sida
Prévalence du VIH parmi les tous les hommes de 15-49 ans	Proportion	Tous les hommes interviewés avec DBS testé au laboratoire
Prévalence du HIV parmi les hommes de 15-59 ans	Proportion	Tous les hommes interviewés de 15-59 ans avec DBS testé
HOMMES ET FEMMES		
Prévalence du VIH parmi tous les enquêtés	Proportion	Toutes les femmes et tous les hommes 15-49 ans interviewés et DBS testé

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période des 5 années avant l'enquête au niveau national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau régional.

² Le rapport de mortalité maternelle n'est calculé pour l'échantillon national que pour la période de 0-6 années avant l'enquête.

Tableau B.2 Erreurs de sondage: Échantillon Total, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,539	0,011	15426	15426	2,624	0,020	0,518	0,560
Alphabétisation	0,692	0,009	15426	15426	2,368	0,013	0,674	0,710
Aucun niveau d'instruction	0,200	0,009	15426	15426	2,745	0,044	0,182	0,218
Niveau secondaire ou plus	0,462	0,009	15426	15426	2,227	0,019	0,444	0,480
Taux net de fréquentation scolaire	0,785	0,010	12698	12664	2,137	0,013	0,765	0,805
Jamais mariée/ Jamais en union	0,279	0,006	15426	15426	1,719	0,022	0,267	0,292
Actuellement mariée/en union	0,635	0,007	15426	15426	1,679	0,010	0,622	0,648
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,596	0,008	11836	11837	1,729	0,013	0,580	0,612
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,617	0,007	11836	11837	1,531	0,011	0,604	0,631
Actuellement enceinte	0,098	0,003	15426	15426	1,231	0,030	0,092	0,104
Enfants déjà nés	2,727	0,032	15426	15426	1,441	0,012	2,662	2,792
Enfants survivants	2,340	0,026	15426	15426	1,388	0,011	2,287	2,393
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,857	0,073	2461	2400	1,187	0,012	5,712	6,002
Connait une méthode contraceptive	0,941	0,006	9805	9792	2,453	0,006	0,930	0,953
Connait une méthode moderne	0,940	0,006	9805	9792	2,431	0,006	0,928	0,951
Utilise actuellement une méthode	0,234	0,008	9805	9792	1,817	0,033	0,218	0,249
Utilise actuellement une méthode moderne	0,144	0,005	9805	9792	1,495	0,037	0,134	0,155
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,089	0,004	9805	9792	1,516	0,049	0,081	0,098
Utilise actuellement la pilule	0,019	0,002	9805	9792	1,148	0,083	0,016	0,022
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	9805	9792	1,087	0,226	0,001	0,003
Utilise actuellement des condoms	0,076	0,004	9805	9792	1,497	0,053	0,068	0,084
Utilise actuellement des injectables	0,030	0,002	9805	9792	1,284	0,074	0,025	0,034
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,067	0,004	9805	9792	1,472	0,055	0,060	0,075
Utilise actuellement le retrait	0,018	0,002	9805	9792	1,205	0,090	0,015	0,021
A utilisé une source du secteur public	0,200	0,009	2447	2459	1,140	0,046	0,182	0,219
Ne veut plus d'enfant	0,267	0,006	9805	9792	1,415	0,024	0,254	0,280
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,350	0,006	9805	9792	1,268	0,017	0,337	0,362
Nombre idéal d'enfants	5,532	0,045	14341	14334	1,969	0,008	5,441	5,622
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,733	0,011	7655	7647	2,146	0,015	0,712	0,755
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,636	0,013	11732	11748	2,324	0,021	0,609	0,662
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,209	0,007	10734	10718	1,647	0,033	0,196	0,223
Traités avec des SRO	0,172	0,012	2078	2243	1,440	0,070	0,148	0,196
Traitement médical recherché	0,228	0,014	2078	2243	1,432	0,060	0,201	0,255
Carnet de vaccination montré	0,570	0,014	2286	2265	1,371	0,025	0,541	0,599
A reçu le vaccin du BCG	0,871	0,011	2286	2265	1,547	0,013	0,849	0,893
A reçu le vaccin du DTCq (3 doses)	0,684	0,016	2286	2265	1,582	0,023	0,652	0,715
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,698	0,014	2286	2265	1,464	0,020	0,669	0,726
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,706	0,014	2286	2265	1,421	0,019	0,678	0,733
A reçu tous les vaccins	0,532	0,016	2286	2265	1,480	0,029	0,500	0,563
Taille pour âge (-2ET)	0,325	0,008	5824	5860	1,171	0,024	0,309	0,340
Poids pour taille (-2ET)	0,056	0,004	5824	5860	1,193	0,067	0,049	0,064
Poids pour âge (-2ET)	0,146	0,006	5824	5860	1,230	0,043	0,133	0,159
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,603	0,009	5390	5432	1,306	0,015	0,584	0,621
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,395	0,008	7819	7803	1,441	0,020	0,379	0,411
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,069	0,005	6991	6980	1,518	0,067	0,060	0,078
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,060	0,003	15426	15426	1,369	0,044	0,055	0,065
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,373	0,020	917	926	1,228	0,053	0,334	0,412
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,547	0,011	3637	3668	1,312	0,020	0,526	0,569
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,368	0,010	3637	3668	1,248	0,027	0,349	0,388
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,223	0,007	7462	7457	1,461	0,032	0,209	0,237
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,120	0,006	7207	7153	1,445	0,046	0,109	0,131
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	5,088	0,103	42934	42970	1,475	0,020	4,882	5,294
Quotient de mortalité néonatale (5 ans)	31,412	2,061	11831	11849	1,163	0,066	27,291	35,534
Quotient de mortalité post-néonatale (5 ans)	31,063	2,151	11827	11824	1,227	0,069	26,760	35,366
Quotient de mortalité infantile (5 ans)	62,476	3,001	11862	11883	1,204	0,048	56,474	68,477
Quotient de mortalité juvénile (5 ans)	63,349	3,222	11353	11426	1,083	0,051	56,906	69,793
Quotient de mortalité infanto-juvénile (5 ans)	121,87	4,502	12099	12129	1,184	0,037	112,86	130,87
Rapport de mortalité maternelle (7 ans)	782	67	184482	182804	1,211	0,086	647	916
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,056	0,003	7254	7221	1,239	0,060	0,049	0,063
HOMMES								
Milieu urbain	0,559	0,012	6452	6455	1,881	0,021	0,536	0,582
Alphabétisé	0,822	0,009	6452	6455	1,845	0,011	0,804	0,840
Aucun niveau d'instruction	0,083	0,007	6452	6455	1,959	0,081	0,069	0,096
Niveau secondaire ou plus	0,596	0,010	6452	6455	1,611	0,017	0,577	0,616
Jamais marié/Jamais en union	0,500	0,008	6452	6455	1,337	0,017	0,483	0,517
Actuellement marié/en union	0,458	0,008	6452	6455	1,359	0,018	0,441	0,475
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,420	0,010	3649	3637	1,258	0,024	0,400	0,441
Connait une méthode contraceptive	0,987	0,003	2989	2958	1,521	0,003	0,981	0,993
Connait une méthode moderne	0,985	0,003	2989	2958	1,510	0,003	0,978	0,991
Ne veut plus d'enfants	0,155	0,008	2989	2958	1,165	0,050	0,140	0,171
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,457	0,012	2989	2958	1,340	0,027	0,432	0,481
Nombre idéal d'enfants	6,434	0,103	6095	6122	1,588	0,016	6,229	6,640
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,441	0,012	2511	2530	1,219	0,027	0,417	0,465
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,470	0,013	2511	2530	1,269	0,027	0,445	0,496
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,290	0,007	6452	6455	1,318	0,026	0,275	0,304
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,430	0,016	1894	1869	1,443	0,038	0,397	0,463
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,041	0,003	6452	6455	1,264	0,076	0,035	0,047
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,397	0,009	6452	6455	1,507	0,023	0,379	0,416
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,184	0,006	6346	6348	1,328	0,035	0,171	0,197
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,029	0,002	6245	6282	1,170	0,086	0,024	0,034
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,029	0,002	6948	6981	1,196	0,083	0,024	0,034
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,043	0,002	13499	13503	1,306	0,053	0,039	0,048

Tableau B.3 Erreurs de sondage: Échantillon Yaoundé/Douala, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	1,000	0,000	2811	3467	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisation	0,948	0,008	2811	3467	1,989	0,009	0,932	0,965
Aucun niveau d'instruction	0,017	0,004	2811	3467	1,484	0,214	0,010	0,024
Niveau secondaire ou plus	0,793	0,014	2811	3467	1,847	0,018	0,765	0,821
Taux net de fréquentation scolaire	0,888	0,009	1332	1636	1,059	0,010	0,869	0,906
Jamais mariée/ Jamais en union	0,347	0,014	2811	3467	1,578	0,041	0,319	0,376
Actuellement mariée/en union	0,543	0,014	2811	3467	1,481	0,026	0,516	0,571
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,379	0,017	2254	2767	1,626	0,044	0,346	0,413
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,501	0,012	2254	2767	1,134	0,024	0,477	0,525
Actuellement enceinte	0,073	0,005	2811	3467	1,086	0,073	0,062	0,083
Enfants déjà nés	1,761	0,041	2811	3467	1,091	0,023	1,679	1,843
Enfants survivants	1,606	0,036	2811	3467	1,065	0,023	1,533	1,678
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	4,453	0,120	332	413	0,947	0,027	4,214	4,693
Connait une méthode contraceptive	0,995	0,002	1523	1884	0,896	0,002	0,992	0,998
Connait une méthode moderne	0,994	0,002	1523	1884	0,886	0,002	0,991	0,998
Utilise actuellement une méthode	0,390	0,018	1523	1884	1,467	0,047	0,353	0,427
Utilise actuellement une méthode moderne	0,229	0,013	1523	1884	1,216	0,057	0,203	0,255
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,161	0,012	1523	1884	1,293	0,076	0,137	0,185
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,004	1523	1884	1,073	0,174	0,016	0,033
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	1523	1884	0,915	0,513	0,000	0,004
Utilise actuellement des condoms	0,152	0,011	1523	1884	1,231	0,074	0,130	0,175
Utilise actuellement des injectables	0,032	0,006	1523	1884	1,239	0,176	0,020	0,043
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,116	0,010	1523	1884	1,213	0,086	0,096	0,136
Utilise actuellement le retrait	0,036	0,006	1523	1884	1,166	0,155	0,025	0,047
A utilisé une source du secteur public	0,117	0,012	717	866	1,015	0,104	0,093	0,141
Ne veut plus d'enfant	0,252	0,012	1523	1884	1,113	0,049	0,227	0,277
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,323	0,013	1523	1884	1,057	0,039	0,297	0,348
Nombre idéal d'enfants	4,420	0,052	2887	3324	1,251	0,012	4,316	4,523
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,793	0,015	1102	1367	1,192	0,018	0,764	0,822
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,958	0,009	1507	1854	1,490	0,009	0,941	0,975
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,161	0,016	1423	1754	1,537	0,098	0,130	0,193
Traités avec des SRO	0,288	0,033	219	283	1,036	0,113	0,223	0,353
Traitement médical recherché	0,305	0,035	219	283	1,067	0,115	0,235	0,375
Carnet de vaccination montré	0,686	0,031	309	385	1,163	0,045	0,625	0,748
A reçu le vaccin du BCG	0,956	0,012	309	385	1,034	0,013	0,931	0,980
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,814	0,022	309	385	1,008	0,027	0,770	0,859
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,731	0,034	309	385	1,332	0,046	0,664	0,798
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,813	0,025	309	385	1,126	0,031	0,763	0,863
A reçu tous les vaccins	0,631	0,033	309	385	1,216	0,053	0,565	0,698
Taille pour âge (-2ET)	0,128	0,014	750	918	1,083	0,109	0,100	0,157
Poids pour taille (-2ET)	0,024	0,006	750	918	1,096	0,257	0,012	0,036
Poids pour âge (-2ET)	0,034	0,007	750	918	1,055	0,217	0,019	0,048
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,552	0,022	690	840	1,100	0,040	0,508	0,595
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,448	0,016	1435	1777	1,249	0,036	0,416	0,481
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,029	0,006	1335	1655	1,245	0,197	0,018	0,040
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,112	0,007	2811	3467	1,223	0,065	0,098	0,127
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,404	0,032	320	389	1,155	0,079	0,340	0,467
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,464	0,021	773	950	1,186	0,046	0,421	0,506
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,458	0,021	773	950	1,191	0,047	0,415	0,500
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,320	0,014	1321	1618	1,092	0,044	0,292	0,348
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,156	0,013	1314	1610	1,260	0,081	0,131	0,181
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	3,344	0,122	8025	9890	1,237	0,037	3,100	3,589
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	33,091	3,947	2669	3309	1,077	0,119	25,198	40,984
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	20,636	3,446	2663	3300	1,198	0,167	13,745	27,528
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	53,728	4,846	2673	3314	1,060	0,090	44,036	63,419
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	23,301	2,968	2590	3211	0,927	0,127	17,365	29,236
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	75,777	5,613	2684	3327	1,056	0,074	64,550	87,003
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,078	0,009	1250	1586	1,191	0,116	0,059	0,096
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	1174	1501	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,960	0,007	1174	1501	1,282	0,008	0,945	0,975
Aucun niveau d'instruction	0,023	0,006	1174	1501	1,361	0,257	0,011	0,035
Niveau secondaire ou plus	0,823	0,016	1174	1501	1,420	0,019	0,792	0,855
Jamais marié/Jamais en union	0,519	0,019	1174	1501	1,287	0,036	0,481	0,556
Actuellement marié/en union	0,437	0,019	1174	1501	1,277	0,042	0,400	0,474
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,502	0,022	692	896	1,134	0,043	0,459	0,545
Connait une méthode contraceptive	1,000	0,000	499	656	na	0,000	1,000	1,000
Connait une méthode moderne	0,999	0,001	499	656	0,851	0,001	0,996	1,001
Ne veut plus d'enfants	0,180	0,019	499	656	1,108	0,106	0,142	0,218
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,381	0,024	499	656	1,087	0,062	0,334	0,428
Nombre idéal d'enfants	4,804	0,106	1122	1433	1,113	0,022	4,591	5,016
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,569	0,027	431	533	1,119	0,047	0,516	0,623
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,330	0,027	431	533	1,173	0,081	0,276	0,383
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,390	0,015	1174	1501	1,069	0,039	0,359	0,420
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,541	0,032	462	585	1,364	0,059	0,478	0,604
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,054	0,007	1174	1501	1,073	0,131	0,040	0,068
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,552	0,016	1174	1501	1,071	0,028	0,521	0,583
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,209	0,015	1170	1496	1,247	0,071	0,180	0,239
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,031	0,005	1090	1471	1,036	0,175	0,020	0,042
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,030	0,005	1190	1603	1,070	0,176	0,020	0,041
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,055	0,006	2340	3057	1,266	0,108	0,043	0,067

Tableau B.4 Erreurs de sondage: Échantillon Autres villes, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	1,000	0,000	4961	4842	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisation	0,791	0,013	4961	4842	2,306	0,017	0,764	0,817
Aucun niveau d'instruction	0,127	0,010	4961	4842	2,198	0,082	0,107	0,148
Niveau secondaire ou plus	0,550	0,017	4961	4842	2,428	0,031	0,516	0,584
Taux net de fréquentation scolaire	0,867	0,009	3687	3663	1,369	0,011	0,848	0,886
Jamais mariée/ Jamais en union	0,339	0,012	4961	4842	1,734	0,034	0,315	0,362
Actuellement mariée/en union	0,568	0,011	4961	4842	1,540	0,019	0,546	0,590
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,557	0,014	3677	3582	1,683	0,025	0,529	0,585
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,604	0,011	3677	3582	1,425	0,019	0,581	0,627
Actuellement enceinte	0,084	0,005	4961	4842	1,148	0,054	0,075	0,093
Enfants déjà nés	2,420	0,057	4961	4842	1,495	0,024	2,306	2,534
Enfants survivants	2,129	0,048	4961	4842	1,458	0,023	2,032	2,226
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,667	0,122	742	733	1,122	0,022	5,423	5,911
Connaît une méthode contraceptive	0,982	0,003	2849	2750	1,375	0,003	0,975	0,989
Connaît une méthode moderne	0,982	0,003	2849	2750	1,375	0,003	0,975	0,989
Utilise actuellement une méthode	0,295	0,014	2849	2750	1,663	0,048	0,267	0,324
Utilise actuellement une méthode moderne	0,194	0,010	2849	2750	1,348	0,052	0,174	0,214
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,101	0,008	2849	2750	1,501	0,084	0,084	0,118
Utilise actuellement la pilule	0,028	0,004	2849	2750	1,203	0,133	0,021	0,035
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,001	2849	2750	1,203	0,353	0,001	0,007
Utilise actuellement des condoms	0,100	0,009	2849	2750	1,548	0,087	0,083	0,118
Utilise actuellement des injectables	0,038	0,004	2849	2750	1,165	0,110	0,029	0,046
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,080	0,008	2849	2750	1,533	0,098	0,064	0,095
Utilise actuellement le retrait	0,018	0,003	2849	2750	1,057	0,146	0,013	0,023
A utilisé une source du secteur public	0,224	0,016	935	931	1,139	0,069	0,193	0,256
Ne veut plus d'enfant	0,311	0,011	2849	2750	1,317	0,037	0,288	0,334
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,336	0,012	2849	2750	1,371	0,036	0,312	0,360
Nombre idéal d'enfants	5,060	0,070	4652	4525	1,992	0,014	4,920	5,201
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,813	0,011	2166	2106	1,265	0,013	0,791	0,834
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,813	0,018	3184	3106	2,085	0,022	0,777	0,849
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,187	0,016	2942	2862	2,094	0,085	0,156	0,219
Traités avec des SRO	0,253	0,025	502	536	1,293	0,099	0,203	0,302
Traitement médical recherché	0,279	0,028	502	536	1,389	0,100	0,223	0,335
Carnet de vaccination montré	0,613	0,021	603	564	1,035	0,034	0,571	0,655
A reçu le vaccin du BCG	0,945	0,012	603	564	1,319	0,013	0,920	0,970
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,787	0,020	603	564	1,184	0,026	0,747	0,828
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,738	0,021	603	564	1,158	0,029	0,695	0,780
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,790	0,020	603	564	1,146	0,025	0,751	0,829
A reçu tous les vaccins	0,629	0,023	603	564	1,117	0,036	0,584	0,674
Taille pour âge (-2ET)	0,270	0,013	1646	1603	1,110	0,049	0,244	0,297
Poids pour taille (-2ET)	0,033	0,004	1646	1603	0,944	0,131	0,025	0,042
Poids pour âge (-2ET)	0,094	0,009	1646	1603	1,122	0,097	0,075	0,112
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,572	0,015	1536	1504	1,155	0,027	0,541	0,603
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,389	0,012	2488	2419	1,276	0,032	0,364	0,414
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,062	0,006	2267	2209	1,213	0,099	0,050	0,075
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,056	0,004	4961	4842	1,338	0,078	0,047	0,065
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,469	0,037	279	270	1,233	0,079	0,395	0,542
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,554	0,018	1431	1424	1,398	0,033	0,518	0,591
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,362	0,016	1431	1424	1,291	0,045	0,329	0,394
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,264	0,013	2423	2374	1,457	0,050	0,237	0,290
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,151	0,012	2384	2340	1,653	0,080	0,127	0,175
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	4,458	0,152	13654	13304	1,386	0,034	4,153	4,762
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	26,938	2,584	6028	5914	1,100	0,096	21,771	32,105
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	33,640	3,477	6027	5904	1,318	0,103	26,685	40,594
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	60,577	4,406	6042	5928	1,196	0,073	51,765	69,390
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	44,105	4,570	5892	5780	1,426	0,104	34,964	53,246
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	102,01	6,758	6080	5962	1,342	0,066	88,50	115,53
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,055	0,006	2349	2291	1,220	0,104	0,043	0,066
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	2146	2106	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,902	0,012	2146	2106	1,815	0,013	0,879	0,926
Aucun niveau d'instruction	0,036	0,007	2146	2106	1,725	0,193	0,022	0,050
Niveau secondaire ou plus	0,701	0,016	2146	2106	1,662	0,023	0,668	0,734
Jamais marié/Jamais en union	0,582	0,014	2146	2106	1,341	0,025	0,553	0,610
Actuellement marié/en union	0,382	0,015	2146	2106	1,411	0,039	0,353	0,412
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,406	0,018	1067	1050	1,221	0,045	0,370	0,443
Connaît une méthode contraceptive	0,996	0,002	838	805	0,916	0,002	0,991	1,000
Connaît une méthode moderne	0,996	0,002	838	805	0,916	0,002	0,991	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,192	0,017	838	805	1,233	0,087	0,159	0,226
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,452	0,024	838	805	1,413	0,054	0,403	0,500
Nombre idéal d'enfants	5,464	0,125	2038	2009	1,467	0,023	5,215	5,713
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,438	0,019	1009	989	1,202	0,043	0,401	0,476
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,459	0,019	1009	989	1,228	0,042	0,421	0,498
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,269	0,014	2146	2106	1,495	0,053	0,241	0,298
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,506	0,033	594	567	1,610	0,065	0,440	0,572
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,042	0,006	2146	2106	1,396	0,144	0,030	0,054
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,465	0,018	2146	2106	1,638	0,038	0,430	0,501
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,214	0,011	2131	2094	1,291	0,054	0,191	0,237
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,030	0,005	2067	2051	1,394	0,176	0,019	0,040
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,029	0,005	2242	2235	1,401	0,172	0,019	0,039
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,043	0,004	4416	4342	1,255	0,089	0,035	0,051

Tableau B.5 Erreurs de sondage: Échantillon Urbain, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	1,000	0,000	7772	8309	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisation	0,856	0,009	7772	8309	2,213	0,010	0,839	0,874
Aucun niveau d'instruction	0,081	0,007	7772	8309	2,130	0,081	0,068	0,094
Niveau secondaire ou plus	0,651	0,012	7772	8309	2,261	0,019	0,627	0,676
Taux net de fréquentation scolaire	0,874	0,007	5019	5300	1,277	0,008	0,859	0,888
Jamais mariée/ Jamais en union	0,342	0,009	7772	8309	1,674	0,026	0,324	0,360
Actuellement mariée/en union	0,558	0,009	7772	8309	1,530	0,015	0,540	0,575
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,480	0,011	5931	6350	1,670	0,023	0,458	0,501
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,559	0,008	5931	6350	1,290	0,015	0,542	0,576
Actuellement enceinte	0,080	0,003	7772	8309	1,131	0,044	0,073	0,086
Enfants déjà nés	2,145	0,038	7772	8309	1,387	0,018	2,068	2,222
Enfants survivants	1,911	0,033	7772	8309	1,349	0,017	1,845	1,976
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,230	0,090	1074	1146	1,052	0,017	5,050	5,410
Connaît une méthode contraceptive	0,987	0,002	4372	4633	1,246	0,002	0,983	0,992
Connaît une méthode moderne	0,987	0,002	4372	4633	1,241	0,002	0,983	0,991
Utilise actuellement une méthode	0,334	0,012	4372	4633	1,615	0,035	0,311	0,357
Utilise actuellement une méthode moderne	0,208	0,008	4372	4633	1,307	0,039	0,192	0,224
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,126	0,007	4372	4633	1,439	0,057	0,111	0,140
Utilise actuellement la pilule	0,027	0,003	4372	4633	1,151	0,105	0,021	0,032
Utilise actuellement le DIU	0,003	0,001	4372	4633	1,112	0,294	0,001	0,005
Utilise actuellement des condoms	0,122	0,007	4372	4633	1,440	0,059	0,107	0,136
Utilise actuellement des injectables	0,035	0,003	4372	4633	1,203	0,095	0,029	0,042
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,094	0,006	4372	4633	1,401	0,066	0,082	0,107
Utilise actuellement le retrait	0,025	0,003	4372	4633	1,181	0,111	0,020	0,031
A utilisé une source du secteur public	0,173	0,010	1652	1797	1,073	0,058	0,153	0,193
Ne veut plus d'enfant	0,287	0,008	4372	4633	1,219	0,029	0,270	0,304
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,331	0,009	4372	4633	1,247	0,027	0,313	0,348
Nombre idéal d'enfants	4,789	0,046	7339	7849	1,697	0,010	4,697	4,881
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,805	0,009	3268	3473	1,239	0,011	0,788	0,822
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,867	0,012	4691	4960	2,016	0,014	0,842	0,892
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,177	0,012	4365	4616	1,909	0,066	0,154	0,201
Traités avec des SRO	0,265	0,020	721	819	1,183	0,074	0,226	0,304
Traitement médical recherché	0,288	0,022	721	819	1,286	0,077	0,243	0,333
Carnet de vaccination montré	0,643	0,018	912	950	1,097	0,028	0,607	0,678
A reçu le vaccin du BCG	0,949	0,009	912	950	1,206	0,009	0,932	0,967
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,798	0,015	912	950	1,110	0,019	0,768	0,828
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,735	0,019	912	950	1,252	0,025	0,698	0,772
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,799	0,015	912	950	1,136	0,019	0,769	0,830
A reçu tous les vaccins	0,630	0,019	912	950	1,171	0,030	0,592	0,668
Taille pour âge (-2ET)	0,219	0,010	2396	2521	1,106	0,047	0,198	0,239
Poids pour taille (-2ET)	0,030	0,004	2396	2521	0,985	0,119	0,023	0,037
Poids pour âge (-2ET)	0,072	0,006	2396	2521	1,057	0,088	0,059	0,084
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,565	0,013	2226	2344	1,133	0,022	0,539	0,590
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,414	0,010	3923	4196	1,268	0,024	0,394	0,434
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,048	0,004	3602	3865	1,199	0,089	0,040	0,057
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,079	0,004	7772	8309	1,310	0,051	0,071	0,087
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,430	0,024	599	659	1,188	0,056	0,382	0,478
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,518	0,014	2204	2374	1,309	0,027	0,490	0,546
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,400	0,013	2204	2374	1,249	0,033	0,374	0,426
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,286	0,010	3744	3992	1,316	0,034	0,267	0,306
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,153	0,009	3698	3950	1,491	0,058	0,135	0,171
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	3,977	0,109	21678	23194	1,334	0,027	3,760	4,194
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	29,145	2,179	8697	9223	1,091	0,075	24,788	33,503
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	28,993	2,598	8690	9204	1,262	0,090	23,796	34,189
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	58,138	3,326	8715	9242	1,142	0,057	51,487	64,789
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	36,824	3,243	8482	8991	1,291	0,088	30,338	43,310
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	92,821	4,920	8764	9289	1,240	0,053	82,981	102,660
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,064	0,005	3599	3877	1,249	0,080	0,054	0,074
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	3320	3607	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,926	0,007	3320	3607	1,640	0,008	0,911	0,941
Aucun niveau d'instruction	0,031	0,005	3320	3607	1,587	0,155	0,021	0,040
Niveau secondaire ou plus	0,752	0,012	3320	3607	1,558	0,016	0,728	0,775
Jamais marié/Jamais en union	0,555	0,012	3320	3607	1,334	0,021	0,532	0,578
Actuellement marié/en union	0,405	0,012	3320	3607	1,369	0,029	0,382	0,428
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,450	0,014	1759	1946	1,185	0,031	0,422	0,478
Connaît une méthode contraceptive	0,998	0,001	1337	1461	0,854	0,001	0,995	1,000
Connaît une méthode moderne	0,997	0,001	1337	1461	0,873	0,001	0,994	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,187	0,013	1337	1461	1,178	0,067	0,162	0,212
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,420	0,017	1337	1461	1,276	0,041	0,385	0,454
Nombre idéal d'enfants	5,189	0,084	3160	3442	1,320	0,016	5,020	5,358
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,484	0,016	1440	1522	1,205	0,033	0,452	0,516
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,414	0,016	1440	1522	1,243	0,039	0,382	0,446
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,320	0,011	3320	3607	1,304	0,033	0,298	0,341
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,524	0,023	1056	1152	1,478	0,043	0,478	0,569
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,047	0,005	3320	3607	1,246	0,097	0,038	0,056
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,501	0,012	3320	3607	1,381	0,024	0,477	0,525
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,212	0,009	3301	3590	1,281	0,043	0,194	0,230
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,030	0,004	3157	3522	1,242	0,125	0,023	0,038
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,029	0,004	3432	3838	1,261	0,124	0,022	0,037
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,048	0,003	6756	7399	1,297	0,070	0,041	0,055

Tableau B.6 Erreurs de sondage: Échantillon Rural, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,000	0,000	7654	7117	na	na	0,000	0,000
Alphabétisation	0,500	0,014	7654	7117	2,532	0,029	0,471	0,529
Aucun niveau d'instruction	0,339	0,016	7654	7117	3,019	0,048	0,306	0,371
Niveau secondaire ou plus	0,241	0,011	7654	7117	2,190	0,044	0,219	0,262
Taux net de fréquentation scolaire	0,721	0,016	7679	7364	2,430	0,022	0,690	0,753
Jamais mariée/ Jamais en union	0,206	0,008	7654	7117	1,652	0,037	0,190	0,221
Actuellement mariée/en union	0,725	0,009	7654	7117	1,706	0,012	0,707	0,742
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,730	0,010	5905	5487	1,650	0,013	0,711	0,750
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,685	0,011	5905	5487	1,815	0,016	0,663	0,707
Actuellement enceinte	0,120	0,005	7654	7117	1,285	0,040	0,110	0,129
Enfants déjà nés	3,407	0,050	7654	7117	1,447	0,015	3,307	3,507
Enfants survivants	2,841	0,040	7654	7117	1,406	0,014	2,760	2,922
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	6,430	0,107	1387	1254	1,279	0,017	6,216	6,644
Connaît une méthode contraceptive	0,900	0,011	5433	5158	2,580	0,012	0,879	0,921
Connaît une méthode moderne	0,897	0,010	5433	5158	2,543	0,012	0,876	0,918
Utilise actuellement une méthode	0,144	0,009	5433	5158	1,907	0,063	0,126	0,162
Utilise actuellement une méthode moderne	0,087	0,006	5433	5158	1,614	0,071	0,075	0,099
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,057	0,005	5433	5158	1,531	0,084	0,047	0,067
Utilise actuellement la pilule	0,013	0,002	5433	5158	1,087	0,130	0,009	0,016
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	5433	5158	0,991	0,344	0,000	0,003
Utilise actuellement des condoms	0,035	0,004	5433	5158	1,425	0,102	0,028	0,042
Utilise actuellement des injectables	0,025	0,003	5433	5158	1,351	0,114	0,019	0,031
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,043	0,004	5433	5158	1,506	0,096	0,035	0,051
Utilise actuellement le retrait	0,011	0,002	5433	5158	1,184	0,153	0,008	0,014
A utilisé une source du secteur public	0,276	0,021	795	662	1,306	0,075	0,235	0,318
Ne veut plus d'enfant	0,249	0,009	5433	5158	1,549	0,036	0,231	0,267
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,367	0,008	5433	5158	1,274	0,023	0,350	0,383
Nombre idéal d'enfants	6,430	0,073	7002	6485	2,073	0,011	6,284	6,577
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,674	0,018	4387	4175	2,563	0,027	0,638	0,709
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,467	0,019	7041	6788	2,573	0,042	0,428	0,506
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,233	0,008	6369	6102	1,493	0,036	0,217	0,250
Traités avec des SRO	0,118	0,012	1357	1424	1,403	0,105	0,094	0,143
Traitement médical recherché	0,193	0,017	1357	1424	1,538	0,087	0,160	0,227
Carnet de vaccination montré	0,517	0,021	1374	1315	1,535	0,040	0,476	0,559
A reçu le vaccin du BCG	0,814	0,017	1374	1315	1,625	0,021	0,780	0,848
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,601	0,023	1374	1315	1,770	0,039	0,554	0,648
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,671	0,020	1374	1315	1,607	0,030	0,630	0,712
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,638	0,020	1374	1315	1,534	0,031	0,598	0,678
A reçu tous les vaccins	0,461	0,022	1374	1315	1,656	0,048	0,416	0,506
Taille pour âge (-2ET)	0,405	0,011	3428	3339	1,215	0,027	0,384	0,427
Poids pour taille (-2ET)	0,076	0,006	3428	3339	1,340	0,081	0,064	0,089
Poids pour âge (-2ET)	0,202	0,010	3428	3339	1,348	0,049	0,182	0,222
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,632	0,013	3164	3088	1,464	0,021	0,605	0,658
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,373	0,013	3896	3608	1,618	0,034	0,347	0,398
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,095	0,009	3389	3115	1,735	0,093	0,077	0,112
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,037	0,003	7654	7117	1,357	0,079	0,032	0,043
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,232	0,027	318	267	1,137	0,116	0,178	0,286
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,601	0,017	1433	1294	1,277	0,027	0,568	0,634
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,311	0,015	1433	1294	1,197	0,047	0,281	0,340
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,150	0,011	3718	3465	1,847	0,072	0,129	0,172
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,080	0,006	3509	3203	1,268	0,073	0,068	0,092
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	6,395	0,121	21256	19776	1,470	0,019	6,152	6,638
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	34,935	1,932	13527	13041	1,057	0,055	31,071	38,799
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	42,352	2,534	13505	13009	1,265	0,060	37,284	47,420
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	77,287	3,274	13550	13062	1,206	0,042	70,739	83,836
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	82,499	3,531	13295	12804	1,144	0,043	75,436	89,561
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	153,41	5,054	13720	13231	1,209	0,033	143,30	163,52
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,046	0,004	3655	3344	1,181	0,089	0,038	0,054
HOMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	3132	2847	na	na	0,000	0,000
Alphabétisé	0,690	0,016	3132	2847	1,885	0,023	0,659	0,721
Aucun niveau d'instruction	0,148	0,014	3132	2847	2,134	0,091	0,121	0,175
Niveau secondaire ou plus	0,400	0,013	3132	2847	1,532	0,034	0,373	0,426
Jamais marié/Jamais en union	0,430	0,012	3132	2847	1,314	0,027	0,406	0,453
Actuellement marié/en union	0,526	0,012	3132	2847	1,315	0,022	0,502	0,549
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,386	0,015	1890	1690	1,315	0,038	0,357	0,416
Connaît une méthode contraceptive	0,977	0,006	1652	1497	1,641	0,006	0,964	0,989
Connaît une méthode moderne	0,973	0,007	1652	1497	1,636	0,007	0,959	0,986
Ne veut plus d'enfants	0,125	0,009	1652	1497	1,081	0,070	0,107	0,143
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,492	0,017	1652	1497	1,387	0,035	0,458	0,526
Nombre idéal d'enfants	8,033	0,192	2935	2681	1,706	0,024	7,650	8,417
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,376	0,019	1071	1007	1,261	0,050	0,338	0,413
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,556	0,020	1071	1007	1,310	0,036	0,516	0,595
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,252	0,011	3132	2847	1,354	0,042	0,231	0,273
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,280	0,020	838	717	1,282	0,071	0,240	0,320
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,034	0,004	3132	2847	1,234	0,118	0,026	0,042
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,266	0,012	3132	2847	1,583	0,047	0,241	0,291
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,149	0,009	3045	2758	1,394	0,060	0,131	0,167
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,027	0,003	3088	2760	0,996	0,107	0,021	0,033
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,028	0,003	3516	3144	1,059	0,105	0,022	0,034
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,038	0,003	6743	6104	1,276	0,079	0,032	0,044

Tableau B.7 Erreurs de sondage: Échantillon Adamaoua, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,483	0,038	1279	746	2,711	0,079	0,407	0,559
Alphabétisation	0,512	0,036	1279	746	2,558	0,070	0,440	0,584
Aucun niveau d'instruction	0,395	0,034	1279	746	2,504	0,087	0,327	0,464
Niveau secondaire ou plus	0,228	0,032	1279	746	2,711	0,141	0,162	0,290
Taux net de fréquentation scolaire	0,759	0,022	1115	647	1,388	0,030	0,714	0,803
Jamais mariée/ Jamais en union	0,209	0,017	1279	746	1,502	0,082	0,175	0,244
Actuellement mariée/en union	0,703	0,018	1279	746	1,394	0,025	0,667	0,739
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,785	0,022	985	571	1,668	0,028	0,742	0,829
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,694	0,019	985	571	1,292	0,027	0,656	0,732
Actuellement enceinte	0,086	0,008	1279	746	1,018	0,093	0,070	0,102
Enfants déjà nés	2,918	0,087	1279	746	1,054	0,030	2,745	3,091
Enfants survivants	2,482	0,072	1279	746	1,018	0,029	2,339	2,625
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	6,501	0,267	184	105	1,066	0,041	5,968	7,034
Connaît une méthode contraceptive	0,969	0,008	904	524	1,345	0,008	0,954	0,985
Connaît une méthode moderne	0,969	0,008	904	524	1,345	0,008	0,954	0,985
Utilise actuellement une méthode	0,111	0,016	904	524	1,490	0,141	0,080	0,142
Utilise actuellement une méthode moderne	0,106	0,015	904	524	1,508	0,146	0,075	0,136
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,005	0,003	904	524	1,135	0,520	0,000	0,011
Utilise actuellement la pilule	0,012	0,004	904	524	0,990	0,298	0,005	0,019
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,002	904	524	1,015	0,544	0,000	0,008
Utilise actuellement des condoms	0,034	0,007	904	524	1,230	0,220	0,019	0,048
Utilise actuellement des injectables	0,027	0,005	904	524	1,021	0,205	0,016	0,038
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,005	0,003	904	524	1,135	0,520	0,000	0,011
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	904	524	na	na	0,000	0,000
A utilisé une source du secteur public	0,407	0,052	117	71	1,134	0,127	0,303	0,511
Ne veut plus d'enfant	0,229	0,015	904	524	1,098	0,067	0,199	0,260
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,245	0,017	904	524	1,202	0,070	0,211	0,280
Nombre idéal d'enfants	5,715	0,151	1079	640	2,043	0,026	5,449	6,053
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,717	0,022	673	387	1,265	0,031	0,673	0,761
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,474	0,036	1056	596	1,825	0,075	0,402	0,546
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,134	0,014	960	543	1,221	0,106	0,106	0,163
Traités avec des SRO	0,195	0,032	136	73	0,893	0,165	0,131	0,259
Traitement médical recherché	0,314	0,039	136	73	0,907	0,123	0,237	0,391
Carnet de vaccination montré	0,731	0,045	198	111	1,384	0,061	0,642	0,820
A reçu le vaccin du BCG	0,894	0,026	198	111	1,163	0,029	0,842	0,946
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,690	0,038	198	111	1,137	0,055	0,613	0,766
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,761	0,033	198	111	1,058	0,043	0,696	0,827
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,640	0,040	198	111	1,136	0,062	0,560	0,720
A reçu tous les vaccins	0,537	0,042	198	111	1,143	0,078	0,454	0,621
Taille pour âge (-2ET)	0,398	0,029	535	316	1,317	0,074	0,339	0,457
Poids pour taille (-2ET)	0,064	0,011	535	316	1,101	0,179	0,041	0,086
Poids pour âge (-2ET)	0,208	0,022	535	316	1,087	0,105	0,164	0,252
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,619	0,027	488	289	1,212	0,043	0,566	0,673
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,358	0,026	654	378	1,397	0,074	0,305	0,411
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,168	0,024	582	339	1,523	0,140	0,121	0,216
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,027	0,006	1279	746	1,354	0,230	0,014	0,039
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,566	0,071	33	20	0,818	0,126	0,423	0,709
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,739	0,042	239	143	1,477	0,057	0,654	0,823
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,202	0,039	239	143	1,488	0,192	0,124	0,280
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,170	0,025	621	366	1,644	0,146	0,120	0,219
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,072	0,017	603	356	1,571	0,230	0,039	0,105
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	5,211	0,284	3532	2056	1,346	0,054	4,643	5,779
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	41,400	4,577	1998	1131	0,871	0,111	32,247	50,553
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	32,968	4,293	1992	1129	0,971	0,130	24,383	41,554
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	74,368	6,068	2001	1134	0,930	0,082	62,233	86,503
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	59,451	6,475	1949	1102	0,918	0,109	46,502	72,400
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	129,40	8,709	2022	1145	0,983	0,067	111,98	146,82
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,071	0,017	615	350	1,667	0,243	0,037	0,106
HOMMES								
Milieu urbain	0,486	0,041	469	262	1,787	0,085	0,403	0,569
Alphabétisé	0,765	0,030	469	262	1,519	0,039	0,705	0,825
Aucun niveau d'instruction	0,165	0,026	469	262	1,499	0,156	0,114	0,217
Niveau secondaire ou plus	0,453	0,038	469	262	1,633	0,083	0,378	0,528
Jamais marié/Jamais en union	0,512	0,025	469	262	1,075	0,048	0,463	0,562
Actuellement marié/en union	0,468	0,025	469	262	1,090	0,054	0,418	0,519
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,290	0,036	248	139	1,243	0,124	0,218	0,362
Connaît une méthode contraceptive	0,986	0,008	222	122	0,981	0,008	0,970	1,001
Connaît une méthode moderne	0,984	0,008	222	122	0,935	0,008	0,968	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,105	0,025	222	122	1,199	0,235	0,056	0,155
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,440	0,034	222	122	1,029	0,078	0,372	0,509
Nombre idéal d'enfants	7,586	0,404	375	211	1,465	0,053	6,778	8,394
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,362	0,046	197	110	1,328	0,126	0,270	0,453
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,533	0,044	197	110	1,234	0,083	0,445	0,621
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,091	0,015	469	262	1,106	0,162	0,062	0,120
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,254	0,062	42	24	0,909	0,243	0,131	0,377
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,007	0,005	469	262	1,340	0,740	0,000	0,017
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,304	0,034	469	262	1,617	0,113	0,235	0,372
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,110	0,023	462	258	1,595	0,212	0,063	0,157
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,023	0,008	462	254	1,088	0,333	0,008	0,038
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,028	0,008	504	277	1,101	0,290	0,012	0,044
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,051	0,012	1077	604	1,793	0,236	0,027	0,075

Tableau B.8 Erreurs de sondage: Échantillon Centre (sans Yaoundé), Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,381	0,033	1233	1092	2,409	0,088	0,314	0,448
Alphabétisation	0,875	0,016	1233	1092	1,705	0,018	0,843	0,907
Aucun niveau d'instruction	0,021	0,006	1233	1092	1,543	0,303	0,008	0,033
Niveau secondaire ou plus	0,575	0,024	1233	1092	1,731	0,042	0,526	0,623
Taux net de fréquentation scolaire	0,916	0,011	1038	867	1,148	0,012	0,894	0,937
Jamais mariée/ Jamais en union	0,217	0,018	1233	1092	1,520	0,082	0,182	0,253
Actuellement mariée/en union	0,682	0,020	1233	1092	1,542	0,030	0,641	0,723
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,553	0,027	959	846	1,652	0,048	0,500	0,606
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,670	0,017	959	846	1,104	0,025	0,636	0,703
Actuellement enceinte	0,088	0,010	1233	1092	1,214	0,111	0,068	0,108
Enfants déjà nés	2,790	0,103	1233	1092	1,344	0,037	2,583	2,996
Enfants survivants	2,419	0,081	1233	1092	1,221	0,033	2,258	2,581
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,528	0,257	232	195	1,278	0,046	5,015	6,042
Connaît une méthode contraceptive	0,993	0,003	854	744	1,172	0,003	0,986	0,999
Connaît une méthode moderne	0,991	0,004	854	744	1,144	0,004	0,983	0,998
Utilise actuellement une méthode	0,336	0,025	854	744	1,520	0,073	0,287	0,385
Utilise actuellement une méthode moderne	0,246	0,020	854	744	1,353	0,081	0,206	0,286
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,089	0,014	854	744	1,464	0,160	0,061	0,118
Utilise actuellement la pilule	0,032	0,007	854	744	1,179	0,222	0,018	0,046
Utilise actuellement le DIU	0,008	0,003	854	744	1,063	0,411	0,001	0,014
Utilise actuellement des condoms	0,119	0,018	854	744	1,641	0,153	0,082	0,155
Utilise actuellement des injectables	0,064	0,010	854	744	1,209	0,158	0,044	0,084
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,062	0,011	854	744	1,328	0,178	0,040	0,083
Utilise actuellement le retrait	0,023	0,006	854	744	1,198	0,268	0,011	0,035
A utilisé une source du secteur public	0,265	0,033	261	248	1,190	0,123	0,200	0,330
Ne veut plus d'enfant	0,277	0,021	854	744	1,353	0,075	0,235	0,318
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,373	0,024	854	744	1,445	0,064	0,325	0,420
Nombre idéal d'enfants	5,214	0,113	1185	1049	1,598	0,022	4,988	5,441
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,773	0,020	666	568	1,246	0,026	0,733	0,814
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,785	0,027	1032	876	1,648	0,034	0,731	0,838
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,159	0,016	949	814	1,324	0,101	0,127	0,191
Traités avec des SRO	0,144	0,035	149	130	1,161	0,240	0,075	0,214
Traitement médical recherché	0,217	0,051	149	130	1,460	0,233	0,116	0,318
Carnet de vaccination montré	0,467	0,045	203	168	1,240	0,095	0,378	0,556
A reçu le vaccin du BCG	0,926	0,021	203	168	1,101	0,022	0,884	0,967
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,755	0,031	203	168	1,003	0,041	0,693	0,817
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,669	0,036	203	168	1,058	0,054	0,596	0,742
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,730	0,034	203	168	1,040	0,046	0,663	0,797
A reçu tous les vaccins	0,516	0,035	203	168	0,959	0,068	0,446	0,586
Taille pour âge (-2ET)	0,234	0,027	498	414	1,280	0,116	0,180	0,288
Poids pour taille (-2ET)	0,043	0,010	498	414	0,954	0,230	0,023	0,063
Poids pour âge (-2ET)	0,083	0,014	498	414	0,982	0,167	0,055	0,110
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,658	0,034	448	375	1,359	0,052	0,590	0,727
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,481	0,020	599	515	0,962	0,041	0,441	0,521
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,036	0,007	536	471	0,929	0,209	0,021	0,051
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,123	0,013	1233	1092	1,393	0,106	0,097	0,149
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,357	0,050	142	135	1,238	0,140	0,257	0,457
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,404	0,044	210	196	1,283	0,108	0,317	0,492
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,481	0,042	210	196	1,221	0,088	0,397	0,566
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,223	0,019	617	560	1,135	0,085	0,185	0,261
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,134	0,017	610	555	1,212	0,125	0,101	0,168
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	5,589	0,284	3463	3068	1,154	0,051	5,000	6,138
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	32,682	4,736	1904	1623	1,013	0,145	23,209	42,154
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	32,401	4,643	1893	1607	1,057	0,143	23,115	41,688
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	65,083	7,257	1911	1629	1,099	0,112	50,569	79,597
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	59,829	7,870	1831	1551	1,152	0,132	44,088	75,570
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	121,02	10,751	1924	1640	1,205	0,089	99,517	142,520
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,069	0,011	593	544	1,049	0,159	0,047	0,091
HOMMES								
Milieu urbain	0,426	0,049	566	534	2,363	0,116	0,327	0,524
Alphabétisé	0,919	0,017	566	534	1,465	0,018	0,885	0,952
Aucun niveau d'instruction	0,013	0,005	566	534	1,004	0,363	0,004	0,023
Niveau secondaire ou plus	0,719	0,023	566	534	1,191	0,031	0,674	0,764
Jamais marié/Jamais en union	0,510	0,036	566	534	1,716	0,071	0,438	0,583
Actuellement marié/en union	0,435	0,040	566	534	1,914	0,092	0,355	0,515
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,593	0,039	309	294	1,406	0,066	0,515	0,672
Connaît une méthode contraceptive	0,995	0,005	269	233	1,142	0,005	0,985	1,005
Connaît une méthode moderne	0,995	0,005	269	233	1,142	0,005	0,985	1,005
Ne veut plus d'enfants	0,176	0,024	269	233	1,025	0,136	0,128	0,223
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,435	0,028	269	233	0,933	0,065	0,378	0,491
Nombre idéal d'enfants	5,917	0,233	533	504	1,256	0,039	5,450	6,384
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,553	0,038	219	207	1,122	0,068	0,477	0,628
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,350	0,038	219	207	1,173	0,108	0,274	0,426
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,398	0,030	566	534	1,477	0,076	0,338	0,459
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,480	0,077	215	213	2,223	0,160	0,326	0,633
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,051	0,010	566	534	1,078	0,195	0,031	0,071
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,437	0,043	566	534	2,076	0,100	0,350	0,523
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,190	0,023	560	530	1,363	0,119	0,144	0,235
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,053	0,017	545	518	1,816	0,331	0,018	0,087
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,049	0,015	634	597	1,773	0,310	0,019	0,080
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,061	0,010	1,138	1,062	1,380	0,161	0,041	0,080

Tableau B.9 Erreurs de sondage: Échantillon Douala, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	1,000	0,000	1459	1712	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisation	0,954	0,009	1459	1712	1,567	0,009	0,937	0,971
Aucun niveau d'instruction	0,017	0,006	1459	1712	1,778	0,350	0,005	0,030
Niveau secondaire ou plus	0,791	0,019	1459	1712	1,803	0,024	0,753	0,829
Taux net de fréquentation scolaire	0,897	0,013	669	792	1,076	0,014	0,871	0,922
Jamais mariée/ Jamais en union	0,361	0,017	1459	1712	1,368	0,048	0,326	0,395
Actuellement mariée/en union	0,547	0,019	1459	1712	1,419	0,034	0,510	0,584
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,353	0,020	1183	1395	1,443	0,057	0,312	0,393
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,495	0,017	1183	1395	1,144	0,034	0,462	0,529
Actuellement enceinte	0,081	0,008	1459	1712	1,076	0,095	0,065	0,096
Enfants déjà nés	1,771	0,055	1459	1712	1,046	0,031	1,660	1,882
Enfants survivants	1,602	0,048	1459	1712	1,014	0,030	1,506	1,698
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	4,486	0,166	186	217	0,963	0,037	4,153	4,819
Connait une méthode contraceptive	0,992	0,003	797	936	0,932	0,003	0,986	0,998
Connait une méthode moderne	0,992	0,003	797	936	0,932	0,003	0,986	0,998
Utilise actuellement une méthode	0,407	0,021	797	936	1,209	0,052	0,365	0,449
Utilise actuellement une méthode moderne	0,214	0,016	797	936	1,117	0,076	0,182	0,247
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,193	0,016	797	936	1,115	0,081	0,162	0,224
Utilise actuellement la pilule	0,017	0,005	797	936	1,033	0,282	0,007	0,026
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,002	797	936	0,974	0,725	0,000	0,006
Utilise actuellement des condoms	0,155	0,015	797	936	1,145	0,095	0,125	0,184
Utilise actuellement des injectables	0,023	0,007	797	936	1,269	0,291	0,010	0,037
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,132	0,013	797	936	1,096	0,100	0,105	0,158
Utilise actuellement le retrait	0,049	0,008	797	936	1,093	0,170	0,032	0,066
A utilisé une source du secteur public	0,086	0,017	368	428	1,163	0,198	0,052	0,120
Ne veut plus d'enfant	0,271	0,019	797	936	1,196	0,070	0,233	0,309
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,317	0,018	797	936	1,104	0,057	0,281	0,354
Nombre idéal d'enfants	4,279	0,056	1378	1626	1,131	0,013	4,167	4,390
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,813	0,017	556	648	1,046	0,021	0,778	0,847
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,988	0,005	784	906	1,100	0,005	0,979	0,998
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,112	0,014	745	861	1,185	0,126	0,084	0,141
Traités avec des SRO	0,256	0,067	85	97	1,389	0,262	0,121	0,390
Traitement médical recherché	0,256	0,058	85	97	1,223	0,228	0,139	0,372
Carnet de vaccination montré	0,732	0,043	147	168	1,146	0,058	0,646	0,817
A reçu le vaccin du BCG	0,981	0,011	147	168	0,928	0,011	0,960	1,002
A reçu le vaccin du DTCocq (3 doses)	0,841	0,033	147	168	1,072	0,039	0,775	0,907
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,747	0,047	147	168	1,285	0,063	0,653	0,841
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,848	0,031	147	168	1,038	0,037	0,785	0,910
A reçu tous les vaccins	0,673	0,044	147	168	1,113	0,065	0,586	0,761
Taille pour âge (-2ET)	0,129	0,020	404	477	1,089	0,154	0,089	0,169
Poids pour taille (-2ET)	0,025	0,009	404	477	1,156	0,363	0,007	0,043
Poids pour âge (-2ET)	0,032	0,010	404	477	1,092	0,301	0,013	0,051
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,625	0,028	375	447	1,034	0,044	0,569	0,680
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,532	0,021	775	930	1,196	0,040	0,490	0,575
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,030	0,009	701	842	1,387	0,295	0,012	0,048
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,111	0,010	1459	1712	1,255	0,093	0,090	0,132
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,385	0,048	157	190	1,240	0,126	0,288	0,482
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,447	0,026	409	478	1,045	0,058	0,395	0,498
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,455	0,027	409	478	1,078	0,058	0,402	0,508
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,316	0,021	670	765	1,142	0,065	0,275	0,357
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,167	0,017	669	764	1,207	0,104	0,132	0,202
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	3,185	0,162	4172	4903	1,147	0,051	2,861	3,508
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	33,547	6,016	1379	1603	1,155	0,179	21,514	45,579
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	15,830	4,960	1374	1596	1,450	0,313	5,911	25,750
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	49,377	6,354	1382	1606	1,056	0,129	36,669	62,085
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	27,128	4,197	1335	1559	0,874	0,155	18,735	35,521
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	75,165	7,343	1388	1613	0,981	0,098	60,480	89,851
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,064	0,011	650	739	1,099	0,165	0,043	0,085
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	604	707	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,961	0,010	604	707	1,264	0,010	0,941	0,981
Aucun niveau d'instruction	0,027	0,008	604	707	1,278	0,315	0,010	0,043
Niveau secondaire ou plus	0,829	0,020	604	707	1,290	0,024	0,790	0,869
Jamais marié/Jamais en union	0,567	0,024	604	707	1,171	0,042	0,519	0,614
Actuellement marié/en union	0,398	0,021	604	707	1,067	0,053	0,355	0,441
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,519	0,030	363	424	1,132	0,057	0,460	0,579
Connait une méthode contraceptive	1,000	0,000	243	281	na	0,000	1,000	1,000
Connait une méthode moderne	0,997	0,003	243	281	0,908	0,003	0,990	1,003
Ne veut plus d'enfants	0,188	0,027	243	281	1,065	0,142	0,134	0,241
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,337	0,035	243	281	1,160	0,105	0,266	0,407
Nombre idéal d'enfants	4,503	0,140	575	674	1,352	0,031	4,224	4,782
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,588	0,033	227	267	1,007	0,056	0,523	0,654
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,326	0,033	227	267	1,047	0,100	0,261	0,392
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,383	0,019	604	707	0,971	0,050	0,345	0,421
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,601	0,036	236	271	1,130	0,060	0,529	0,674
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,042	0,009	604	707	1,143	0,223	0,023	0,060
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,527	0,023	604	707	1,154	0,045	0,480	0,574
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,162	0,020	601	704	1,319	0,122	0,122	0,202
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,026	0,007	580	693	0,994	0,253	0,013	0,039
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,025	0,006	641	766	0,984	0,242	0,013	0,037
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,046	0,007	1230	1432	1,134	0,148	0,032	0,059

Tableau B.10 Erreurs de sondage: Échantillon Est, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,463	0,036	974	604	2,271	0,079	0,390	0,535
Alphabétisation	0,714	0,028	974	604	1,958	0,040	0,658	0,771
Aucun niveau d'instruction	0,153	0,032	974	604	2,749	0,208	0,089	0,217
Niveau secondaire ou plus	0,420	0,030	974	604	1,874	0,071	0,361	0,480
Taux net de fréquentation scolaire	0,852	0,015	979	613	1,140	0,018	0,821	0,883
Jamais mariée/ Jamais en union	0,191	0,016	974	604	1,256	0,083	0,159	0,223
Actuellement mariée/en union	0,717	0,018	974	604	1,223	0,025	0,681	0,752
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,678	0,022	724	447	1,279	0,033	0,634	0,723
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,752	0,018	724	447	1,125	0,024	0,716	0,788
Actuellement enceinte	0,120	0,013	974	604	1,257	0,109	0,093	0,146
Enfants déjà nés	2,767	0,087	974	604	1,035	0,032	2,592	2,942
Enfants survivants	2,451	0,081	974	604	1,081	0,033	2,289	2,614
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,573	0,285	145	88	1,109	0,051	5,004	6,143
Connaît une méthode contraceptive	0,872	0,020	713	433	1,623	0,023	0,832	0,913
Connaît une méthode moderne	0,872	0,020	713	433	1,623	0,023	0,832	0,913
Utilise actuellement une méthode	0,125	0,022	713	433	1,739	0,172	0,082	0,169
Utilise actuellement une méthode moderne	0,091	0,018	713	433	1,630	0,193	0,056	0,126
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,034	0,008	713	433	1,163	0,231	0,018	0,050
Utilise actuellement la pilule	0,013	0,004	713	433	0,944	0,304	0,005	0,022
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	713	433	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement des condoms	0,056	0,014	713	433	1,584	0,244	0,029	0,083
Utilise actuellement des injectables	0,016	0,005	713	433	1,127	0,334	0,005	0,026
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,032	0,008	713	433	1,189	0,245	0,016	0,048
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	713	433	0,861	1,005	0,000	0,003
A utilisé une source du secteur public	0,347	0,067	99	68	1,389	0,193	0,213	0,482
Ne veut plus d'enfant	0,238	0,018	713	433	1,133	0,076	0,202	0,274
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,263	0,019	713	433	1,137	0,071	0,225	0,300
Nombre idéal d'enfants	5,418	0,115	956	594	1,602	0,021	5,187	5,649
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,758	0,020	536	327	1,102	0,027	0,717	0,799
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,489	0,033	822	500	1,532	0,068	0,423	0,555
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,182	0,015	766	463	1,055	0,083	0,152	0,212
Traités avec des SRO	0,244	0,047	142	84	1,174	0,192	0,150	0,338
Traitement médical recherché	0,325	0,053	142	84	1,276	0,162	0,220	0,430
Carnet de vaccination montré	0,480	0,046	155	93	1,132	0,097	0,387	0,573
A reçu le vaccin du BCG	0,910	0,020	155	93	0,874	0,022	0,869	0,950
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,659	0,041	155	93	1,067	0,063	0,577	0,742
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,574	0,043	155	93	1,061	0,075	0,489	0,660
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,744	0,035	155	93	0,998	0,048	0,673	0,815
A reçu tous les vaccins	0,473	0,049	155	93	1,191	0,103	0,376	0,571
Taille pour âge (-2ET)	0,373	0,024	427	263	0,955	0,064	0,325	0,421
Poids pour taille (-2ET)	0,059	0,012	427	263	0,959	0,208	0,034	0,083
Poids pour âge (-2ET)	0,154	0,020	427	263	1,047	0,133	0,113	0,195
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,668	0,032	388	238	1,227	0,048	0,604	0,733
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,435	0,025	504	311	1,150	0,059	0,384	0,486
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,105	0,015	436	271	1,000	0,140	0,075	0,134
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,050	0,008	974	604	1,190	0,166	0,034	0,067
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,312	0,079	49	30	1,180	0,254	0,153	0,470
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,473	0,055	151	100	1,357	0,117	0,362	0,584
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,426	0,059	151	100	1,445	0,137	0,309	0,544
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,258	0,031	466	290	1,501	0,118	0,197	0,319
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,073	0,015	447	276	1,191	0,200	0,044	0,103
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	5,370	0,299	2695	1669	1,271	0,056	4,772	5,968
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	23,264	4,528	1578	956	1,083	0,195	14,209	32,320
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	24,795	3,893	1575	955	0,973	0,157	17,009	32,582
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	48,060	6,327	1580	958	1,077	0,132	35,405	60,715
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	50,699	6,235	1549	938	1,009	0,123	38,228	63,169
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	96,322	7,987	1598	967	0,978	0,083	80,347	112,300
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,088	0,013	461	281	0,955	0,143	0,063	0,113
HOMMES								
Milieu urbain	0,445	0,036	447	270	1,508	0,080	0,374	0,516
Alphabétisé	0,888	0,019	447	270	1,260	0,021	0,850	0,926
Aucun niveau d'instruction	0,074	0,021	447	270	1,661	0,279	0,033	0,115
Niveau secondaire ou plus	0,614	0,030	447	270	1,287	0,048	0,554	0,673
Jamais marié/Jamais en union	0,373	0,029	447	270	1,272	0,078	0,315	0,431
Actuellement marié/en union	0,568	0,028	447	270	1,174	0,048	0,513	0,623
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,523	0,040	272	163	1,311	0,076	0,443	0,602
Connaît une méthode contraceptive	0,984	0,007	256	154	0,901	0,007	0,970	0,998
Connaît une méthode moderne	0,984	0,007	256	154	0,901	0,007	0,970	0,998
Ne veut plus d'enfants	0,153	0,032	256	154	1,413	0,208	0,089	0,217
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,446	0,026	256	154	0,843	0,059	0,394	0,499
Nombre idéal d'enfants	6,554	0,208	440	267	1,116	0,032	6,138	6,970
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,521	0,040	131	81	0,920	0,077	0,440	0,601
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,364	0,043	131	81	1,020	0,118	0,278	0,450
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,405	0,031	447	270	1,330	0,076	0,343	0,467
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,336	0,031	187	110	0,903	0,093	0,274	0,399
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,080	0,019	447	270	1,478	0,238	0,042	0,118
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,391	0,032	447	270	1,394	0,082	0,327	0,456
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,134	0,015	438	265	0,917	0,111	0,104	0,164
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,037	0,007	441	263	0,822	0,200	0,022	0,052
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,038	0,007	475	283	0,848	0,197	0,023	0,052
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,063	0,009	902	544	1,050	0,134	0,046	0,080

Tableau B.11 Erreurs de sondage: Échantillon Extrême-Nord, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,226	0,018	1666	2490	1,789	0,081	0,189	0,263
Alphabétisation	0,225	0,022	1666	2490	2,143	0,098	0,181	0,269
Aucun niveau d'instruction	0,626	0,028	1666	2490	2,397	0,045	0,569	0,683
Niveau secondaire ou plus	0,079	0,013	1666	2490	2,035	0,170	0,052	0,106
Taux net de fréquentation scolaire	0,522	0,033	1863	2807	2,216	0,063	0,456	0,588
Jamais mariée/ Jamais en union	0,155	0,014	1666	2490	1,561	0,090	0,127	0,182
Actuellement mariée/en union	0,798	0,016	1666	2490	1,593	0,020	0,766	0,829
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,857	0,013	1269	1905	1,333	0,015	0,831	0,884
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,683	0,026	1269	1905	1,974	0,038	0,631	0,734
Actuellement enceinte	0,148	0,011	1666	2490	1,249	0,073	0,127	0,170
Enfants déjà nés	3,726	0,092	1666	2490	1,159	0,025	3,542	3,909
Enfants survivants	3,038	0,078	1666	2490	1,197	0,026	2,882	3,195
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	7,310	0,264	256	382	1,294	0,036	6,783	7,837
Connaît une méthode contraceptive	0,823	0,024	1311	1986	2,226	0,029	0,776	0,870
Connaît une méthode moderne	0,820	0,024	1311	1986	2,228	0,029	0,772	0,868
Utilise actuellement une méthode	0,037	0,006	1311	1986	1,150	0,163	0,025	0,049
Utilise actuellement une méthode moderne	0,033	0,006	1311	1986	1,146	0,170	0,022	0,045
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,003	0,002	1311	1986	0,991	0,470	0,000	0,007
Utilise actuellement la pilule	0,008	0,003	1311	1986	1,135	0,341	0,003	0,014
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	1311	1986	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement des condoms	0,005	0,002	1311	1986	1,124	0,430	0,001	0,010
Utilise actuellement des injectables	0,016	0,005	1311	1986	1,434	0,315	0,006	0,025
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	1311	1986	1,043	0,605	0,000	0,005
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	1311	1986	0,688	1,009	0,000	0,001
A utilisé une source du secteur public	0,542	0,071	56	85	1,057	0,131	0,399	0,684
Ne veut plus d'enfant	0,220	0,016	1311	1986	1,439	0,075	0,187	0,253
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,400	0,016	1311	1986	1,147	0,039	0,369	0,431
Nombre idéal d'enfants	7,431	0,162	1496	2227	1,961	0,022	7,107	7,756
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,551	0,034	1049	1592	2,229	0,062	0,482	0,619
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,251	0,025	1768	2682	1,921	0,100	0,201	0,301
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,312	0,014	1547	2351	1,111	0,044	0,285	0,339
Traités avec des SRO	0,081	0,019	476	733	1,411	0,231	0,044	0,119
Traitement médical recherché	0,157	0,026	476	733	1,493	0,168	0,104	0,210
Carnet de vaccination montré	0,395	0,040	315	476	1,426	0,100	0,316	0,474
A reçu le vaccin du BCG	0,696	0,035	315	476	1,329	0,050	0,626	0,766
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,452	0,042	315	476	1,498	0,094	0,367	0,537
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,610	0,035	315	476	1,246	0,057	0,541	0,679
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,524	0,036	315	476	1,253	0,068	0,452	0,595
A reçu tous les vaccins	0,309	0,038	315	476	1,431	0,121	0,234	0,384
Taille pour âge (-2ET)	0,449	0,022	762	1195	1,146	0,049	0,405	0,493
Poids pour taille (-2ET)	0,118	0,015	762	1195	1,272	0,127	0,088	0,149
Poids pour âge (-2ET)	0,316	0,019	762	1195	1,063	0,060	0,278	0,354
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,635	0,025	720	1132	1,348	0,040	0,584	0,685
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,365	0,028	851	1276	1,696	0,077	0,309	0,421
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,174	0,021	720	1070	1,496	0,122	0,131	0,216
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,026	0,005	1666	2490	1,243	0,185	0,017	0,036
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,172	0,071	43	66	1,214	0,413	0,030	0,315
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,836	0,027	264	380	1,170	0,032	0,782	0,889
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,139	0,026	264	380	1,197	0,184	0,088	0,190
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,074	0,013	793	1183	1,398	0,176	0,048	0,100
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,084	0,013	657	975	1,172	0,152	0,058	0,109
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	6,771	0,222	4588	6874	1,344	0,033	6,328	7,214
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	37,827	3,502	3462	5233	0,949	0,093	30,823	44,831
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	47,669	4,476	3451	5210	1,170	0,094	38,717	56,620
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	85,496	5,459	3465	5238	1,044	0,064	74,578	96,413
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	90,347	6,008	3398	5135	1,061	0,067	78,33	102,36
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	168,12	8,214	3504	5301	1,110	0,049	151,69	184,55
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,015	0,004	769	1151	0,913	0,269	0,007	0,023
HOMMES								
Milieu urbain	0,268	0,029	625	956	1,638	0,108	0,210	0,326
Alphabétisé	0,533	0,035	625	956	1,739	0,065	0,464	0,603
Aucun niveau d'instruction	0,261	0,034	625	956	1,921	0,130	0,194	0,329
Niveau secondaire ou plus	0,295	0,030	625	956	1,629	0,101	0,236	0,355
Jamais marié/Jamais en union	0,423	0,024	625	956	1,225	0,057	0,375	0,472
Actuellement marié/en union	0,552	0,025	625	956	1,278	0,046	0,501	0,603
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,225	0,031	352	540	1,404	0,139	0,162	0,288
Connaît une méthode contraceptive	0,955	0,015	344	527	1,343	0,016	0,925	0,985
Connaît une méthode moderne	0,947	0,016	344	527	1,357	0,017	0,914	0,980
Ne veut plus d'enfants	0,061	0,014	344	527	1,083	0,230	0,033	0,089
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,570	0,041	344	527	1,519	0,071	0,489	0,651
Nombre idéal d'enfants	10,424	0,509	570	880	1,754	0,049	9,406	11,443
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,191	0,030	241	364	1,163	0,155	0,132	0,250
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,721	0,036	241	364	1,257	0,051	0,648	0,794
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,185	0,020	625	956	1,270	0,107	0,145	0,224
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,101	0,036	120	177	1,311	0,360	0,028	0,173
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,030	0,008	625	956	1,193	0,273	0,013	0,046
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,173	0,023	625	956	1,529	0,134	0,126	0,219
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,147	0,020	594	912	1,364	0,135	0,107	0,187
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,008	0,003	596	929	0,964	0,451	0,001	0,014
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,009	0,003	660	1037	0,945	0,383	0,002	0,016
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,012	0,003	1365	2080	1,063	0,266	0,005	0,018

Tableau B.12 Erreurs de sondage: Échantillon Littoral (sans Douala), Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,688	0,033	896	615	2,097	0,047	0,623	0,753
Alphabétisation	0,864	0,017	896	615	1,519	0,020	0,829	0,899
Aucun niveau d'instruction	0,026	0,006	896	615	1,175	0,239	0,014	0,039
Niveau secondaire ou plus	0,638	0,026	896	615	1,642	0,041	0,585	0,691
Taux net de fréquentation scolaire	0,942	0,009	666	470	1,015	0,010	0,923	0,961
Jamais mariée/ Jamais en union	0,293	0,015	896	615	0,965	0,050	0,264	0,323
Actuellement mariée/en union	0,601	0,016	896	615	0,979	0,027	0,569	0,633
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,503	0,029	691	474	1,518	0,058	0,445	0,561
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,610	0,020	691	474	1,064	0,032	0,571	0,650
Actuellement enceinte	0,084	0,009	896	615	0,929	0,103	0,066	0,101
Enfants déjà nés	2,501	0,083	896	615	1,019	0,033	2,335	2,667
Enfants survivants	2,208	0,074	896	615	1,029	0,033	2,061	2,355
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	0,566	0,213	164	113	1,125	0,042	4,630	5,481
Connaît une méthode contraceptive	0,987	0,007	537	370	1,410	0,007	0,974	1,001
Connaît une méthode moderne	0,987	0,007	537	370	1,410	0,007	0,974	1,001
Utilise actuellement une méthode	0,297	0,033	537	370	1,694	0,113	0,230	0,364
Utilise actuellement une méthode moderne	0,164	0,020	537	370	1,223	0,119	0,125	0,204
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,132	0,019	537	370	1,330	0,147	0,093	0,171
Utilise actuellement la pilule	0,030	0,008	537	370	1,104	0,273	0,013	0,046
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	537	370	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement des condoms	0,088	0,016	537	370	1,305	0,182	0,056	0,120
Utilise actuellement des injectables	0,038	0,009	537	370	1,122	0,244	0,019	0,056
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,100	0,019	537	370	1,454	0,189	0,062	0,138
Utilise actuellement le retrait	0,029	0,007	537	370	0,979	0,245	0,015	0,043
A utilisé une source du secteur public	0,230	0,046	141	100	1,286	0,199	0,138	0,322
Ne veut plus d'enfant	0,342	0,026	537	370	1,252	0,075	0,291	0,394
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,347	0,021	537	370	1,036	0,061	0,304	0,390
Nombre idéal d'enfants	4,881	0,108	857	590	1,438	0,022	4,664	5,097
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,815	0,019	413	283	0,989	0,023	0,777	0,853
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,942	0,023	586	404	1,709	0,024	0,896	0,987
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,162	0,021	540	371	1,295	0,128	0,120	0,203
Traités avec des SRO	0,311	0,059	88	60	1,125	0,189	0,193	0,428
Traitement médical recherché	0,379	0,058	88	60	1,091	0,154	0,262	0,496
Carnet de vaccination montré	0,660	0,041	128	90	0,980	0,063	0,577	0,743
A reçu le vaccin du BCG	0,983	0,011	128	90	1,018	0,012	0,961	1,006
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,809	0,037	128	90	1,051	0,046	0,735	0,883
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,757	0,043	128	90	1,123	0,057	0,671	0,843
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,856	0,031	128	90	0,962	0,036	0,794	0,917
A reçu tous les vaccins	0,663	0,050	128	90	1,189	0,075	0,563	0,763
Taille pour âge (-2ET)	0,244	0,029	321	226	1,042	0,118	0,186	0,302
Poids pour taille (-2ET)	0,012	0,006	321	226	0,984	0,484	0,000	0,025
Poids pour âge (-2ET)	0,047	0,014	321	226	1,143	0,289	0,020	0,075
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,568	0,034	300	210	1,165	0,060	0,500	0,636
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,376	0,027	453	316	1,205	0,072	0,322	0,431
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,022	0,009	411	285	1,274	0,416	0,004	0,040
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,064	0,011	896	615	1,295	0,166	0,042	0,085
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,316	0,047	55	39	0,752	0,150	0,221	0,410
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,459	0,038	231	156	1,141	0,082	0,384	0,534
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,469	0,036	231	156	1,081	0,076	0,398	0,540
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,240	0,025	438	296	1,245	0,106	0,189	0,291
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,100	0,021	426	287	1,469	0,214	0,058	0,143
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	4,632	0,252	2501	1720	1,087	0,054	4,129	5,135
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	33,969	7,414	1100	767	1,156	0,218	19,140	48,797
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	29,391	5,398	1096	764	0,965	0,184	18,595	40,187
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	63,360	11,807	1101	767	1,373	0,186	39,745	86,974
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	45,311	8,115	1050	736	1,034	0,179	29,081	61,541
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	105,80	16,083	1108	772	1,395	0,152	73,633	137,97
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,051	0,012	424	286	1,098	0,232	0,027	0,074
HOMMES								
Milieu urbain	0,723	0,036	418	287	1,650	0,050	0,650	0,795
Alphabétisé	0,930	0,013	418	287	1,051	0,014	0,904	0,956
Aucun niveau d'instruction	0,007	0,004	418	287	0,957	0,561	0,000	0,015
Niveau secondaire ou plus	0,749	0,031	418	287	1,445	0,041	0,687	0,810
Jamais marié/Jamais en union	0,544	0,029	418	287	1,199	0,054	0,485	0,602
Actuellement marié/en union	0,386	0,027	418	287	1,116	0,069	0,333	0,439
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,548	0,035	230	160	1,067	0,064	0,477	0,618
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	160	111	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	160	111	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,332	0,041	160	111	1,109	0,125	0,249	0,415
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,391	0,041	160	111	1,054	0,104	0,309	0,472
Nombre idéal d'enfants	5,218	0,284	409	281	1,518	0,055	4,649	5,787
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,585	0,031	178	121	0,847	0,054	0,523	0,648
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,347	0,028	178	121	0,774	0,080	0,291	0,402
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,332	0,027	418	287	1,182	0,082	0,278	0,387
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,472	0,043	138	95	1,003	0,091	0,387	0,558
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,039	0,014	418	287	1,442	0,349	0,012	0,067
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,380	0,031	418	287	1,315	0,082	0,318	0,443
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,150	0,019	417	286	1,085	0,127	0,112	0,188
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,027	0,007	404	281	0,882	0,265	0,013	0,041
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,030	0,008	461	320	1,052	0,277	0,013	0,047
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,039	0,007	828	567	1,106	0,192	0,024	0,054

Tableau B.13 Erreurs de sondage: Échantillon Nord, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,368	0,045	1576	1676	3,674	0,122	0,278	0,457
Alphabétisation	0,305	0,029	1576	1676	2,498	0,095	0,247	0,363
Aucun niveau d'instruction	0,520	0,028	1576	1676	2,238	0,054	0,464	0,577
Niveau secondaire ou plus	0,126	0,023	1576	1676	2,688	0,179	0,081	0,171
Taux net de fréquentation scolaire	0,668	0,027	1545	1652	1,817	0,040	0,614	0,722
Jamais mariée/ Jamais en union	0,167	0,019	1576	1676	1,969	0,111	0,130	0,205
Actuellement mariée/en union	0,743	0,020	1576	1676	1,804	0,027	0,703	0,783
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,843	0,014	1239	1315	1,380	0,017	0,814	0,871
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,650	0,017	1239	1315	1,271	0,026	0,616	0,685
Actuellement enceinte	0,124	0,008	1576	1676	1,015	0,068	0,107	0,141
Enfants déjà nés	3,709	0,097	1576	1676	1,152	0,026	3,516	3,902
Enfants survivants	2,924	0,082	1576	1676	1,212	0,028	2,761	3,087
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	7,117	0,289	270	297	1,346	0,041	6,539	7,694
Connaît une méthode contraceptive	0,918	0,013	1180	1245	1,599	0,014	0,892	0,943
Connaît une méthode moderne	0,917	0,013	1180	1245	1,607	0,014	0,891	0,943
Utilise actuellement une méthode	0,049	0,008	1180	1245	1,287	0,165	0,033	0,065
Utilise actuellement une méthode moderne	0,047	0,008	1180	1245	1,313	0,172	0,031	0,064
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,002	0,001	1180	1245	0,895	0,595	0,000	0,004
Utilise actuellement la pilule	0,011	0,003	1180	1245	1,015	0,275	0,005	0,018
Utilise actuellement le DIU	0,001	0,001	1180	1245	1,036	1,008	0,000	0,003
Utilise actuellement des condoms	0,004	0,002	1180	1245	0,939	0,408	0,001	0,008
Utilise actuellement des injectables	0,020	0,006	1180	1245	1,522	0,314	0,007	0,032
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	1180	1245	0,895	0,595	0,000	0,004
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	1180	1245	na	na	0,000	0,000
A utilisé une source du secteur public	0,651	0,059	59	73	0,940	0,090	0,533	0,769
Ne veut plus d'enfant	0,217	0,014	1180	1245	1,130	0,063	0,190	0,244
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,355	0,017	1180	1245	1,236	0,048	0,321	0,390
Nombre idéal d'enfants	7,077	0,177	1181	1257	1,771	0,025	6,724	7,430
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,641	0,034	910	971	2,148	0,053	0,572	0,709
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,329	0,029	1572	1662	1,913	0,087	0,272	0,387
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,358	0,024	1373	1454	1,747	0,068	0,309	0,407
Traités avec des SRO	0,127	0,030	483	521	1,925	0,240	0,066	0,188
Traitement médical recherché	0,153	0,021	483	521	1,183	0,140	0,110	0,196
Carnet de vaccination montré	0,469	0,043	284	286	1,399	0,092	0,383	0,556
A reçu le vaccin du BCG	0,748	0,040	284	286	1,501	0,053	0,668	0,828
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,489	0,051	284	286	1,641	0,104	0,387	0,590
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,614	0,049	284	286	1,641	0,080	0,516	0,713
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,517	0,046	284	286	1,477	0,088	0,426	0,608
A reçu tous les vaccins	0,381	0,049	284	286	1,622	0,128	0,283	0,478
Taille pour âge (-2ET)	0,402	0,024	703	759	1,209	0,059	0,354	0,449
Poids pour taille (-2ET)	0,102	0,011	703	759	0,955	0,110	0,080	0,125
Poids pour âge (-2ET)	0,236	0,022	703	759	1,309	0,092	0,192	0,279
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,682	0,025	647	703	1,326	0,037	0,631	0,733
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,407	0,024	759	802	1,324	0,058	0,359	0,454
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,114	0,013	636	674	1,051	0,116	0,088	0,141
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,015	0,004	1576	1676	1,164	0,235	0,008	0,023
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,325	0,093	23	26	0,935	0,286	0,139	0,511
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,824	0,058	249	268	2,366	0,070	0,709	0,940
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,139	0,052	249	268	2,362	0,376	0,034	0,244
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,069	0,017	806	858	1,935	0,251	0,034	0,103
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,059	0,019	778	831	2,263	0,325	0,021	0,097
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	6,527	0,283	4422	4691	1,247	0,043	5,961	7,093
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	35,219	3,870	3083	3265	1,009	0,110	27,479	42,959
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	61,215	6,734	3096	3279	1,292	0,110	47,748	74,683
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	96,435	8,411	3094	3277	1,306	0,087	79,612	113,26
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	104,98	9,555	3074	3245	1,257	0,091	85,866	124,09
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	191,29	13,220	3146	3328	1,459	0,069	164,85	217,73
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,032	0,007	778	826	1,129	0,224	0,017	0,046
HOMMES								
Milieu urbain	0,369	0,045	701	729	2,435	0,121	0,280	0,458
Alphabétisé	0,653	0,039	701	729	2,142	0,059	0,576	0,730
Aucun niveau d'instruction	0,211	0,028	701	729	1,843	0,135	0,154	0,268
Niveau secondaire ou plus	0,376	0,032	701	729	1,735	0,085	0,312	0,439
Jamais marié/Jamais en union	0,515	0,023	701	729	1,223	0,045	0,469	0,562
Actuellement marié/en union	0,446	0,025	701	729	1,312	0,055	0,396	0,495
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,297	0,028	365	381	1,158	0,093	0,242	0,353
Connaît une méthode contraceptive	0,992	0,005	311	325	0,969	0,005	0,982	1,002
Connaît une méthode moderne	0,992	0,005	311	325	0,969	0,005	0,982	1,002
Ne veut plus d'enfants	0,084	0,017	311	325	1,082	0,202	0,050	0,119
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,485	0,032	311	325	1,137	0,067	0,421	0,550
Nombre idéal d'enfants	8,028	0,362	648	679	1,439	0,045	7,305	8,752
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,255	0,035	305	316	1,415	0,139	0,184	0,325
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,647	0,037	305	316	1,352	0,057	0,573	0,721
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,115	0,016	701	729	1,362	0,143	0,082	0,148
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,148	0,035	86	84	0,911	0,237	0,078	0,218
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,028	0,012	701	729	1,847	0,409	0,005	0,052
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,225	0,036	701	729	2,303	0,162	0,152	0,298
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,161	0,017	685	715	1,211	0,106	0,127	0,195
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,015	0,004	681	708	0,928	0,291	0,006	0,023
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,013	0,004	759	799	0,937	0,295	0,005	0,021
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,024	0,005	1459	1534	1,219	0,204	0,014	0,034

Tableau B.14 Erreurs de sondage: Échantillon Nord-Ouest, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,426	0,031	1601	1521	2,516	0,073	0,364	0,488
Alphabétisation	0,800	0,015	1601	1521	1,545	0,019	0,769	0,830
Aucun niveau d'instruction	0,063	0,011	1601	1521	1,734	0,168	0,042	0,084
Niveau secondaire ou plus	0,448	0,024	1601	1521	1,957	0,054	0,399	0,497
Taux net de fréquentation scolaire	0,910	0,008	1264	1181	0,976	0,009	0,893	0,927
Jamais mariée/ Jamais en union	0,459	0,019	1601	1521	1,502	0,041	0,422	0,497
Actuellement mariée/en union	0,463	0,016	1601	1521	1,268	0,034	0,431	0,494
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,479	0,019	1166	1101	1,278	0,039	0,442	0,517
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,604	0,018	1166	1101	1,245	0,030	0,568	0,640
Actuellement enceinte	0,069	0,007	1601	1521	1,144	0,105	0,055	0,084
Enfants déjà nés	2,452	0,101	1601	1521	1,565	0,041	2,250	2,654
Enfants survivants	2,256	0,092	1601	1521	1,549	0,041	2,072	2,440
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,442	0,189	296	277	1,309	0,035	5,063	5,821
Connaît une méthode contraceptive	0,971	0,011	749	704	1,747	0,011	0,949	0,992
Connaît une méthode moderne	0,971	0,011	749	704	1,747	0,011	0,949	0,992
Utilise actuellement une méthode	0,381	0,036	749	704	2,024	0,095	0,309	0,453
Utilise actuellement une méthode moderne	0,209	0,023	749	704	1,551	0,110	0,163	0,256
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,172	0,023	749	704	1,657	0,133	0,126	0,217
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,006	749	704	1,146	0,265	0,011	0,037
Utilise actuellement le DIU	0,010	0,005	749	704	1,298	0,472	0,001	0,019
Utilise actuellement des condoms	0,115	0,016	749	704	1,374	0,139	0,083	0,147
Utilise actuellement des injectables	0,034	0,008	749	704	1,135	0,221	0,019	0,049
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,129	0,021	749	704	1,720	0,164	0,086	0,171
Utilise actuellement le retrait	0,037	0,008	749	704	1,203	0,224	0,021	0,054
A utilisé une source du secteur public	0,135	0,018	301	306	0,895	0,131	0,099	0,170
Ne veut plus d'enfant	0,415	0,020	749	704	1,102	0,048	0,376	0,455
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,347	0,016	749	704	0,945	0,047	0,314	0,380
Nombre idéal d'enfants	4,946	0,081	1542	1471	1,629	0,016	4,784	5,108
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,885	0,019	699	649	1,591	0,022	0,847	0,924
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,936	0,021	986	905	2,156	0,023	0,893	0,978
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,085	0,015	938	863	1,498	0,174	0,056	0,115
Traités avec des SRO	0,420	0,061	76	74	1,017	0,146	0,297	0,542
Traitement médical recherché	0,399	0,057	76	74	0,975	0,142	0,286	0,512
Carnet de vaccination montré	0,839	0,026	208	199	0,999	0,031	0,788	0,891
A reçu le vaccin du BCG	0,983	0,009	208	199	0,906	0,010	0,965	1,002
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,954	0,018	208	199	1,048	0,019	0,919	0,990
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,867	0,029	208	199	1,185	0,034	0,808	0,926
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,931	0,017	208	199	0,948	0,019	0,897	0,966
A reçu tous les vaccins	0,825	0,032	208	199	1,167	0,039	0,761	0,888
Taille pour âge (-2ET)	0,356	0,023	569	542	1,098	0,066	0,309	0,403
Poids pour taille (-2ET)	0,021	0,006	569	542	1,079	0,312	0,008	0,034
Poids pour âge (-2ET)	0,071	0,011	569	542	1,002	0,156	0,049	0,093
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,524	0,025	541	515	1,136	0,049	0,474	0,575
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,303	0,020	841	790	1,280	0,067	0,262	0,344
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,025	0,007	783	735	1,170	0,264	0,012	0,038
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,025	0,005	1601	1521	1,367	0,215	0,014	0,035
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,410	0,105	36	37	1,249	0,255	0,201	0,619
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,481	0,029	566	551	1,394	0,061	0,423	0,540
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,386	0,023	566	551	1,117	0,059	0,340	0,432
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,323	0,019	755	726	1,136	0,060	0,285	0,362
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,131	0,019	749	721	1,503	0,141	0,094	0,168
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	4,430	0,232	4377	4170	1,447	0,052	3,966	4,894
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	26,094	4,126	1911	1738	0,941	0,158	17,842	34,346
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	16,576	3,102	1913	1742	1,007	0,187	10,372	22,781
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	42,670	5,257	1914	1741	0,998	0,123	32,156	53,185
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	26,911	3,645	1887	1715	0,895	0,135	19,620	34,202
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	68,433	6,973	1927	1753	1,011	0,102	54,488	82,378
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,072	0,012	750	695	1,291	0,169	0,048	0,097
HOMMES								
Milieu urbain	0,496	0,032	563	529	1,505	0,064	0,433	0,560
Alphabétisé	0,877	0,019	563	529	1,376	0,022	0,839	0,915
Aucun niveau d'instruction	0,019	0,008	563	529	1,416	0,427	0,003	0,036
Niveau secondaire ou plus	0,512	0,027	563	529	1,264	0,052	0,458	0,565
Jamais marié/Jamais en union	0,595	0,026	563	529	1,285	0,044	0,542	0,647
Actuellement marié/en union	0,369	0,024	563	529	1,155	0,064	0,322	0,416
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,379	0,030	298	269	1,056	0,078	0,320	0,439
Connaît une méthode contraceptive	0,993	0,006	216	195	0,971	0,006	0,981	1,004
Connaît une méthode moderne	0,988	0,007	216	195	0,993	0,008	0,973	1,003
Ne veut plus d'enfants	0,270	0,030	216	195	0,983	0,110	0,211	0,330
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,413	0,043	216	195	1,266	0,103	0,328	0,498
Nombre idéal d'enfants	4,799	0,155	530	498	1,461	0,032	4,490	5,109
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,447	0,034	256	252	1,098	0,077	0,378	0,515
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,512	0,035	256	252	1,120	0,068	0,442	0,582
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,209	0,019	563	529	1,079	0,089	0,172	0,246
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,470	0,055	116	110	1,182	0,117	0,359	0,580
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,028	0,006	563	529	0,905	0,225	0,015	0,041
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,427	0,026	563	529	1,260	0,062	0,375	0,480
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,171	0,020	550	517	1,222	0,115	0,132	0,210
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,050	0,009	558	513	0,923	0,171	0,033	0,067
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,050	0,008	627	578	0,948	0,166	0,033	0,066
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,063	0,007	1308	1208	1,103	0,118	0,048	0,078

Tableau B.15 Erreurs de sondage: Échantillon Ouest, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,463	0,042	1320	1634	3,024	0,090	0,380	0,547
Alphabétisation	0,891	0,018	1320	1634	2,090	0,020	0,855	0,927
Aucun niveau d'instruction	0,023	0,006	1320	1634	1,546	0,281	0,010	0,035
Niveau secondaire ou plus	0,569	0,036	1320	1634	2,656	0,064	0,497	0,642
Taux net de fréquentation scolaire	0,946	0,006	1261	1592	0,987	0,007	0,934	0,959
Jamais mariée/ Jamais en union	0,319	0,022	1320	1634	1,747	0,070	0,274	0,364
Actuellement mariée/en union	0,609	0,024	1320	1634	1,787	0,039	0,561	0,657
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,577	0,035	987	1209	2,247	0,061	0,506	0,647
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,635	0,026	987	1209	1,708	0,041	0,582	0,687
Actuellement enceinte	0,101	0,010	1320	1634	1,260	0,104	0,080	0,122
Enfants déjà nés	2,731	0,100	1320	1634	1,340	0,037	2,530	2,931
Enfants survivants	2,413	0,076	1320	1634	1,155	0,031	2,262	2,564
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,827	0,161	220	260	0,904	0,028	5,504	6,149
Connait une méthode contraceptive	0,994	0,003	800	994	1,044	0,003	0,988	1,000
Connait une méthode moderne	0,990	0,004	800	994	1,037	0,004	0,982	0,997
Utilise actuellement une méthode	0,337	0,045	800	994	2,698	0,134	0,247	0,428
Utilise actuellement une méthode moderne	0,164	0,026	800	994	1,997	0,160	0,112	0,217
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,173	0,024	800	994	1,810	0,140	0,124	0,221
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,004	800	994	1,005	0,357	0,003	0,017
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	800	994	0,931	0,807	0,000	0,004
Utilise actuellement des condoms	0,110	0,020	800	994	1,775	0,179	0,071	0,149
Utilise actuellement des injectables	0,022	0,006	800	994	1,105	0,259	0,011	0,034
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,134	0,020	800	994	1,690	0,152	0,094	0,175
Utilise actuellement le retrait	0,032	0,007	800	994	1,092	0,214	0,018	0,045
A utilisé une source du secteur public	0,172	0,025	260	301	1,085	0,148	0,122	0,223
Ne veut plus d'enfant	0,302	0,028	800	994	1,739	0,094	0,245	0,358
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,354	0,024	800	994	1,417	0,068	0,306	0,402
Nombre idéal d'enfants	5,672	0,147	1300	1612	2,203	0,026	5,379	5,965
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,877	0,017	656	820	1,328	0,019	0,843	0,911
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,958	0,011	1054	1314	1,414	0,011	0,937	0,980
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,142	0,014	992	1228	1,196	0,096	0,115	0,169
Traités avec des SRO	0,249	0,033	139	174	0,857	0,132	0,183	0,315
Traitement médical recherché	0,360	0,037	139	174	0,842	0,102	0,287	0,433
Carnet de vaccination montré	0,522	0,043	222	272	1,242	0,082	0,436	0,607
A reçu le vaccin du BCG	0,959	0,015	222	272	1,099	0,015	0,930	0,988
A reçu le vaccin du DTCocq (3 doses)	0,755	0,048	222	272	1,570	0,063	0,660	0,850
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,766	0,046	222	272	1,556	0,060	0,674	0,858
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,798	0,042	222	272	1,504	0,052	0,715	0,881
A reçu tous les vaccins	0,637	0,051	222	272	1,520	0,080	0,536	0,739
Taille pour âge (-2ET)	0,320	0,020	545	702	0,947	0,061	0,280	0,359
Poids pour taille (-2ET)	0,007	0,003	545	702	0,999	0,504	0,000	0,014
Poids pour âge (-2ET)	0,049	0,014	545	702	1,404	0,291	0,020	0,077
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,455	0,031	501	643	1,316	0,068	0,394	0,517
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,231	0,019	679	848	1,160	0,081	0,194	0,268
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,016	0,006	605	756	1,095	0,342	0,005	0,028
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,038	0,006	1320	1634	1,183	0,163	0,026	0,051
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,547	0,080	53	63	1,150	0,146	0,388	0,706
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,555	0,024	387	479	0,932	0,042	0,508	0,602
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,358	0,019	387	479	0,785	0,053	0,319	0,396
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,315	0,029	635	779	1,547	0,091	0,258	0,372
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,159	0,020	630	772	1,349	0,124	0,119	0,198
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	6,043	0,333	3609	4461	1,489	0,055	5,377	6,710
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	15,893	3,014	1932	2398	0,923	0,190	9,865	21,922
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	32,038	6,191	1923	2380	1,344	0,193	19,656	44,420
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	47,931	7,156	1933	2399	1,279	0,149	33,620	62,243
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	54,630	9,340	1877	2316	1,315	0,171	35,951	73,310
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	99,943	13,075	1949	2417	1,402	0,131	73,794	126,09
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,028	0,007	621	748	1,001	0,238	0,015	0,041
HOMMES								
Milieu urbain	0,506	0,050	519	659	2,282	0,099	0,406	0,607
Alphabétisé	0,923	0,017	519	659	1,422	0,018	0,889	0,956
Aucun niveau d'instruction	0,002	0,002	519	659	0,888	1,005	0,000	0,005
Niveau secondaire ou plus	0,698	0,035	519	659	1,751	0,051	0,627	0,769
Jamais marié/Jamais en union	0,517	0,025	519	659	1,119	0,048	0,468	0,566
Actuellement marié/en union	0,439	0,025	519	659	1,150	0,057	0,389	0,489
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,356	0,031	276	350	1,061	0,086	0,295	0,417
Connait une méthode contraceptive	1,000	0,000	225	289	na	0,000	1,000	1,000
Connait une méthode moderne	1,000	0,000	225	289	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,140	0,026	225	289	1,103	0,183	0,089	0,191
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,475	0,033	225	289	0,998	0,070	0,408	0,541
Nombre idéal d'enfants	6,346	0,212	518	658	0,976	0,033	5,922	6,770
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,497	0,033	230	289	0,987	0,066	0,432	0,562
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,404	0,032	230	289	0,999	0,080	0,339	0,469
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,332	0,019	519	659	0,902	0,056	0,295	0,369
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,528	0,035	167	219	0,907	0,066	0,458	0,599
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,036	0,009	519	659	1,049	0,239	0,019	0,053
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,536	0,019	519	659	0,871	0,036	0,498	0,574
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,242	0,027	517	657	1,407	0,110	0,189	0,295
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,029	0,006	512	640	0,855	0,221	0,016	0,041
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,026	0,006	575	713	0,849	0,216	0,015	0,037
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,028	0,005	1133	1388	1,076	0,188	0,018	0,039

Tableau B.16 Erreurs de sondage: Échantillon Sud, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,416	0,039	940	402	2,422	0,094	0,338	0,494
Alphabétisation	0,923	0,014	940	402	1,611	0,015	0,895	0,951
Aucun niveau d'instruction	0,011	0,005	940	402	1,357	0,415	0,002	0,021
Niveau secondaire ou plus	0,694	0,023	940	402	1,510	0,033	0,648	0,739
Taux net de fréquentation scolaire	0,914	0,010	793	341	0,991	0,011	0,894	0,933
Jamais mariée/ Jamais en union	0,306	0,023	940	402	1,522	0,075	0,260	0,351
Actuellement mariée/en union	0,633	0,019	940	402	1,239	0,031	0,594	0,672
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,510	0,030	706	302	1,605	0,059	0,450	0,570
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,780	0,018	706	302	1,167	0,023	0,744	0,817
Actuellement enceinte	0,096	0,008	940	402	0,867	0,087	0,080	0,113
Enfants déjà nés	2,513	0,103	940	402	1,283	0,041	2,307	2,718
Enfants survivants	2,229	0,084	940	402	1,193	0,037	2,062	2,396
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,201	0,161	162	71	0,774	0,031	4,879	5,523
Connaît une méthode contraceptive	0,993	0,003	596	255	1,006	0,003	0,986	1,000
Connaît une méthode moderne	0,990	0,005	596	255	1,280	0,005	0,979	1,000
Utilise actuellement une méthode	0,324	0,026	596	255	1,373	0,081	0,271	0,377
Utilise actuellement une méthode moderne	0,229	0,022	596	255	1,300	0,098	0,185	0,274
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,095	0,015	596	255	1,267	0,161	0,064	0,125
Utilise actuellement la pilule	0,037	0,011	596	255	1,397	0,292	0,015	0,059
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	596	255	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement des condoms	0,107	0,011	596	255	0,892	0,106	0,084	0,130
Utilise actuellement des injectables	0,055	0,011	596	255	1,153	0,195	0,034	0,077
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,074	0,013	596	255	1,203	0,175	0,048	0,099
Utilise actuellement le retrait	0,013	0,005	596	255	1,016	0,368	0,003	0,022
A utilisé une source du secteur public	0,283	0,037	218	93	1,216	0,132	0,209	0,357
Ne veut plus d'enfant	0,301	0,019	596	255	1,036	0,065	0,262	0,340
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,361	0,022	596	255	1,142	0,062	0,316	0,406
Nombre idéal d'enfants	5,230	0,113	938	401	1,551	0,022	5,004	5,456
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,783	0,020	468	198	1,070	0,026	0,742	0,823
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,822	0,025	672	283	1,404	0,030	0,773	0,872
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,147	0,019	624	262	1,180	0,128	0,110	0,185
Traités avec des SRO	0,245	0,041	96	39	0,834	0,169	0,162	0,328
Traitement médical recherché	0,371	0,058	96	39	1,038	0,157	0,255	0,488
Carnet de vaccination montré	0,408	0,045	132	53	1,010	0,110	0,318	0,497
A reçu le vaccin du BCG	0,911	0,025	132	53	0,994	0,028	0,860	0,962
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,567	0,049	132	53	1,076	0,086	0,470	0,664
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,506	0,051	132	53	1,136	0,102	0,403	0,609
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,695	0,041	132	53	0,999	0,059	0,612	0,778
A reçu tous les vaccins	0,352	0,043	132	53	0,999	0,122	0,266	0,437
Taille pour âge (-2ET)	0,331	0,033	357	158	1,185	0,099	0,266	0,397
Poids pour taille (-2ET)	0,045	0,015	357	158	1,104	0,333	0,015	0,074
Poids pour âge (-2ET)	0,101	0,019	357	158	1,016	0,187	0,063	0,139
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,736	0,029	334	148	1,218	0,040	0,677	0,795
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,526	0,021	485	205	0,920	0,040	0,484	0,568
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,070	0,015	435	187	1,208	0,212	0,040	0,099
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,100	0,014	940	402	1,396	0,137	0,073	0,127
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,344	0,043	88	40	0,855	0,126	0,257	0,431
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,259	0,041	241	103	1,439	0,157	0,178	0,341
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,608	0,038	241	103	1,206	0,063	0,532	0,685
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,248	0,028	444	191	1,366	0,113	0,191	0,304
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,226	0,024	438	189	1,217	0,108	0,177	0,275
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	4,621	0,350	2599	1112	1,557	0,076	3,922	5,321
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	23,162	3,576	1268	529	0,817	0,154	16,011	30,314
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	29,996	5,955	1274	531	1,038	0,199	18,085	41,907
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	53,158	6,814	1272	530	0,908	0,128	39,530	66,786
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	52,846	6,008	1237	515	0,806	0,114	40,830	64,861
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	103,20	9,110	1286	536	0,868	0,088	84,974	121,42
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,106	0,014	434	183	0,956	0,133	0,078	0,135
HOMMES								
Milieu urbain	0,388	0,039	440	185	1,657	0,100	0,310	0,465
Alphabétisé	0,912	0,018	440	185	1,299	0,019	0,876	0,947
Aucun niveau d'instruction	0,014	0,006	440	185	1,140	0,462	0,001	0,026
Niveau secondaire ou plus	0,775	0,025	440	185	1,231	0,032	0,726	0,824
Jamais marié/Jamais en union	0,421	0,033	440	185	1,379	0,077	0,356	0,486
Actuellement marié/en union	0,507	0,034	440	185	1,414	0,067	0,440	0,575
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,674	0,032	286	118	1,168	0,048	0,609	0,739
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	238	94	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	238	94	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,216	0,024	238	94	0,897	0,111	0,168	0,264
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,408	0,027	238	94	0,848	0,066	0,354	0,462
Nombre idéal d'enfants	5,710	0,295	429	180	1,545	0,052	5,120	6,300
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,744	0,042	132	59	1,100	0,056	0,660	0,828
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,197	0,039	132	59	1,132	0,200	0,118	0,276
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,460	0,027	440	185	1,150	0,059	0,405	0,515
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,355	0,038	200	85	1,111	0,106	0,280	0,431
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,060	0,015	440	185	1,340	0,254	0,029	0,090
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,413	0,034	440	185	1,442	0,082	0,345	0,481
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,322	0,027	438	184	1,215	0,084	0,268	0,377
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,038	0,012	430	179	1,253	0,306	0,015	0,061
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,035	0,011	488	205	1,337	0,318	0,013	0,057
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,072	0,010	864	363	1,161	0,141	0,052	0,093

Tableau B.17 Erreurs de sondage: Échantillon Sud-ouest, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	0,518	0,034	1130	1180	2,311	0,066	0,450	0,587
Alphabétisation	0,823	0,021	1130	1180	1,832	0,025	0,781	0,864
Aucun niveau d'instruction	0,028	0,006	1130	1180	1,194	0,208	0,017	0,040
Niveau secondaire ou plus	0,538	0,028	1130	1180	1,910	0,053	0,481	0,595
Taux net de fréquentation scolaire	0,906	0,016	842	857	1,468	0,017	0,875	0,937
Jamais mariée/ Jamais en union	0,344	0,022	1130	1180	1,548	0,064	0,300	0,388
Actuellement mariée/en union	0,553	0,020	1130	1180	1,347	0,036	0,513	0,593
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,473	0,025	856	900	1,439	0,052	0,424	0,523
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,566	0,022	856	900	1,298	0,039	0,522	0,610
Actuellement enceinte	0,076	0,008	1130	1180	0,991	0,103	0,060	0,091
Enfants déjà nés	2,408	0,135	1130	1180	1,765	0,056	2,138	2,677
Enfants survivants	2,086	0,108	1130	1180	1,659	0,052	1,871	2,302
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5,511	0,176	200	200	0,972	0,032	5,159	5,863
Connaît une méthode contraceptive	0,997	0,002	638	652	0,775	0,002	0,994	1,001
Connaît une méthode moderne	0,996	0,002	638	652	1,018	0,002	0,992	1,001
Utilise actuellement une méthode	0,400	0,022	638	652	1,123	0,055	0,356	0,443
Utilise actuellement une méthode moderne	0,225	0,018	638	652	1,107	0,081	0,189	0,262
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,174	0,016	638	652	1,062	0,092	0,142	0,206
Utilise actuellement la pilule	0,043	0,009	638	652	1,137	0,212	0,025	0,061
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,002	638	652	0,887	0,745	0,000	0,006
Utilise actuellement des condoms	0,091	0,012	638	652	1,068	0,133	0,067	0,116
Utilise actuellement des injectables	0,054	0,010	638	652	1,156	0,193	0,033	0,074
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,141	0,016	638	652	1,171	0,115	0,108	0,173
Utilise actuellement le retrait	0,025	0,007	638	652	1,146	0,283	0,011	0,039
A utilisé une source du secteur public	0,150	0,022	218	247	0,923	0,149	0,105	0,195
Ne veut plus d'enfant	0,320	0,025	638	652	1,352	0,078	0,270	0,370
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,371	0,024	638	652	1,276	0,066	0,323	0,420
Nombre idéal d'enfants	4,612	0,100	1120	1169	1,551	0,022	4,411	4,812
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,782	0,026	483	485	1,363	0,033	0,731	0,834
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,801	0,040	677	672	2,077	0,049	0,722	0,880
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,119	0,019	622	614	1,356	0,162	0,080	0,157
Traités avec des SRO	0,308	0,059	74	73	1,016	0,190	0,191	0,425
Traitement médical recherché	0,313	0,064	74	73	1,121	0,205	0,184	0,442
Carnet de vaccination montré	0,835	0,047	132	132	1,405	0,057	0,740	0,930
A reçu le vaccin du BCG	0,954	0,023	132	132	1,118	0,024	0,908	1,001
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,887	0,039	132	132	1,343	0,044	0,809	0,966
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,811	0,054	132	132	1,508	0,066	0,704	0,918
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,826	0,041	132	132	1,200	0,050	0,743	0,909
A reçu tous les vaccins	0,752	0,054	132	132	1,399	0,072	0,643	0,861
Taille pour âge (-2ET)	0,270	0,030	357	367	1,184	0,113	0,209	0,330
Poids pour taille (-2ET)	0,028	0,010	357	367	1,224	0,374	0,007	0,049
Poids pour âge (-2ET)	0,080	0,015	357	367	0,913	0,182	0,051	0,110
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,699	0,036	333	340	1,276	0,052	0,627	0,772
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,536	0,025	559	585	1,208	0,048	0,485	0,587
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,031	0,009	512	536	1,132	0,281	0,013	0,048
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,069	0,009	1130	1180	1,218	0,134	0,050	0,087
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,299	0,080	75	81	1,492	0,268	0,139	0,459
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,491	0,038	326	343	1,363	0,077	0,416	0,567
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,411	0,037	326	343	1,336	0,089	0,338	0,484
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,237	0,025	566	589	1,372	0,104	0,188	0,286
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,120	0,021	555	580	1,489	0,171	0,079	0,161
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	4,016	0,300	3123	3258	1,284	0,075	3,415	4,617
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	44,111	6,463	1319	1316	0,984	0,147	31,185	57,038
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	33,106	5,738	1319	1316	1,117	0,173	21,630	44,581
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	77,217	8,244	1321	1318	0,977	0,107	60,729	93,705
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	53,902	9,867	1335	1330	1,421	0,183	34,169	73,636
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	126,96	13,221	1336	1333	1,167	0,104	100,52	153,40
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,079	0,015	559	569	1,291	0,186	0,050	0,109
HOMMES								
Milieu urbain	0,426	0,038	530	543	1,757	0,089	0,350	0,501
Alphabétisé	0,812	0,032	530	543	1,865	0,039	0,748	0,875
Aucun niveau d'instruction	0,015	0,009	530	543	1,715	0,605	0,000	0,033
Niveau secondaire ou plus	0,554	0,037	530	543	1,701	0,067	0,480	0,628
Jamais marié/Jamais en union	0,501	0,027	530	543	1,220	0,053	0,447	0,554
Actuellement marié/en union	0,464	0,023	530	543	1,070	0,050	0,417	0,510
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,462	0,035	321	329	1,251	0,076	0,392	0,531
Connaît une méthode contraceptive	0,977	0,016	249	252	1,663	0,016	0,945	1,009
Connaît une méthode moderne	0,977	0,016	249	252	1,663	0,016	0,945	1,009
Ne veut plus d'enfants	0,218	0,028	249	252	1,082	0,130	0,161	0,275
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,473	0,046	249	252	1,439	0,097	0,382	0,565
Nombre idéal d'enfants	4,688	0,152	521	530	1,455	0,032	4,384	4,992
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,479	0,032	191	197	0,894	0,068	0,414	0,544
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,444	0,032	191	197	0,877	0,071	0,381	0,507
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,309	0,020	530	543	1,011	0,066	0,268	0,349
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,416	0,042	161	168	1,072	0,100	0,333	0,500
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,043	0,011	530	543	1,260	0,259	0,021	0,065
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,414	0,033	530	543	1,546	0,080	0,348	0,481
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,177	0,017	515	526	1,019	0,097	0,143	0,212
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,033	0,008	526	527	1,033	0,245	0,017	0,049
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,037	0,010	575	570	1,236	0,263	0,018	0,057
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,057	0,009	1085	1096	1,286	0,159	0,039	0,075

Tableau B.18 Erreurs de sondage: Échantillon Yaoundé, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de sondage (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Résidence urbaine	1,000	0,000	1352	1755	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisation	0,943	0,014	1352	1755	2,223	0,015	0,915	0,971
Aucun niveau d'instruction	0,016	0,004	1352	1755	1,134	0,239	0,009	0,024
Niveau secondaire ou plus	0,795	0,021	1352	1755	1,881	0,026	0,754	0,836
Taux net de fréquentation scolaire	0,879	0,014	663	844	1,047	0,015	0,852	0,907
Jamais mariée/ Jamais en union	0,334	0,022	1352	1755	1,735	0,067	0,290	0,379
Actuellement mariée/en union	0,540	0,021	1352	1755	1,530	0,038	0,499	0,582
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,407	0,026	1071	1372	1,754	0,065	0,354	0,459
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,507	0,017	1071	1372	1,119	0,034	0,473	0,541
Actuellement enceinte	0,065	0,007	1352	1755	1,080	0,112	0,050	0,079
Enfants déjà nés	1,752	0,060	1352	1755	1,133	0,034	1,631	1,872
Enfants survivants	1,609	0,054	1352	1755	1,105	0,034	1,501	1,718
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	4,417	0,172	146	195	0,924	0,039	4,073	4,760
Connaît une méthode contraceptive	0,998	0,001	726	948	0,802	0,001	0,996	1,001
Connaît une méthode moderne	0,997	0,002	726	948	0,791	0,002	0,993	1,000
Utilise actuellement une méthode	0,373	0,030	726	948	1,669	0,080	0,313	0,433
Utilise actuellement une méthode moderne	0,243	0,020	726	948	1,265	0,083	0,203	0,284
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,130	0,018	726	948	1,453	0,140	0,093	0,166
Utilise actuellement la pilule	0,032	0,007	726	948	1,087	0,222	0,018	0,046
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	726	948	0,847	0,721	0,000	0,005
Utilise actuellement des condoms	0,150	0,017	726	948	1,304	0,115	0,115	0,185
Utilise actuellement des injectables	0,040	0,009	726	948	1,182	0,216	0,023	0,057
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,100	0,015	726	948	1,316	0,146	0,071	0,130
Utilise actuellement le retrait	0,023	0,007	726	948	1,303	0,315	0,009	0,038
A utilisé une source du secteur public	0,147	0,017	349	438	0,906	0,117	0,112	0,181
Ne veut plus d'enfant	0,234	0,016	726	948	1,032	0,069	0,201	0,266
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,328	0,018	726	948	1,011	0,054	0,293	0,363
Nombre idéal d'enfants	4,555	0,083	1309	1699	1,249	0,018	4,389	4,721
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,775	0,023	546	719	1,278	0,029	0,730	0,821
Accouchement assisté par un prestataire formé	0,929	0,016	723	948	1,487	0,017	0,897	0,960
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,208	0,027	678	893	1,627	0,128	0,155	0,261
Traités avec des SRO	0,306	0,035	134	186	0,843	0,114	0,236	0,375
Traitement médical recherché	0,331	0,042	134	186	0,964	0,128	0,246	0,415
Carnet de vaccination montré	0,651	0,042	162	217	1,144	0,065	0,566	0,736
A reçu le vaccin du BCG	0,936	0,019	162	217	0,992	0,020	0,898	0,974
A reçu le vaccin du DTCoq (3 doses)	0,793	0,030	162	217	0,940	0,037	0,734	0,853
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0,719	0,047	162	217	1,339	0,065	0,625	0,813
A reçu le vaccin contre la rougeole	0,786	0,036	162	217	1,126	0,046	0,714	0,858
A reçu tous les vaccins	0,599	0,047	162	217	1,240	0,079	0,504	0,694
Taille pour âge (-2ET)	0,128	0,020	346	441	1,079	0,155	0,088	0,168
Poids pour taille (-2ET)	0,023	0,008	346	441	1,026	0,360	0,006	0,039
Poids pour âge (-2ET)	0,036	0,011	346	441	1,016	0,310	0,014	0,058
Prévalence de l'anémie (Enfants 6-59mois)	0,469	0,031	315	394	1,101	0,066	0,407	0,530
Prévalence de l'anémie (Femmes 15-49 ans)	0,356	0,022	660	846	1,151	0,061	0,313	0,400
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,028	0,007	634	813	1,081	0,254	0,014	0,042
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,113	0,010	1352	1755	1,193	0,091	0,093	0,134
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,421	0,042	163	199	1,081	0,100	0,337	0,505
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,481	0,034	364	472	1,282	0,070	0,413	0,548
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,460	0,034	364	472	1,281	0,073	0,393	0,527
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,324	0,019	651	853	1,046	0,059	0,286	0,362
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,146	0,018	645	846	1,301	0,124	0,110	0,182
Indice Synthétique de Fécondité (3 ans)	3,497	0,181	3853	4987	1,298	0,052	3,136	3,858
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	32,664	5,243	1290	1707	1,001	0,161	22,178	43,151
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	25,123	4,884	1289	1704	1,064	0,194	15,354	34,892
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	57,787	7,359	1291	1708	1,062	0,127	43,069	72,505
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	19,614	4,151	1255	1652	0,980	0,212	11,312	27,917
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	76,268	8,563	1296	1714	1,113	0,112	59,142	93,393
Prévalence du VIH (femmes 15-49 ans)	0,089	0,014	600	847	1,184	0,155	0,062	0,117
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	570	794	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,959	0,011	570	794	1,286	0,011	0,937	0,980
Aucun niveau d'instruction	0,021	0,009	570	794	1,438	0,416	0,003	0,038
Niveau secondaire ou plus	0,818	0,024	570	794	1,491	0,030	0,770	0,866
Jamais marié/Jamais en union	0,476	0,027	570	794	1,312	0,058	0,421	0,531
Actuellement marié/en union	0,472	0,029	570	794	1,364	0,061	0,414	0,529
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,486	0,031	329	473	1,128	0,064	0,424	0,549
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	256	374	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	256	374	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,174	0,027	256	374	1,128	0,154	0,120	0,227
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,414	0,031	256	374	1,013	0,075	0,351	0,476
Nombre idéal d'enfants	5,070	0,162	547	759	1,022	0,032	4,746	5,394
Sexuellement actives au cours de 12 derniers mois parmi les jeunes	0,550	0,042	204	266	1,207	0,077	0,465	0,634
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,333	0,042	204	266	1,269	0,126	0,249	0,417
A eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	0,396	0,023	570	794	1,130	0,059	0,350	0,442
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,489	0,050	226	314	1,485	0,102	0,389	0,588
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,065	0,010	570	794	1,011	0,161	0,044	0,086
A eu un test du VIH et le résultat dans les 12 derniers mois	0,574	0,021	570	794	0,992	0,036	0,533	0,615
Attitudes de tolérance envers personnes vivant avec VIH/SIDA	0,251	0,023	569	792	1,256	0,091	0,206	0,297
Prévalence du VIH (hommes 15-49 ans)	0,036	0,008	510	778	1,019	0,235	0,019	0,052
Prévalence du VIH (hommes 15-59 ans)	0,035	0,008	549	837	1,075	0,242	0,018	0,051
HOMMES ET FEMMES								
Prévalence du VIH (hommes et femmes 15-49 ans)	0,064	0,009	1110	1625	1,273	0,147	0,045	0,082

Tableau B.19 Erreurs de sondage pour les taux de mortalité adulte et les taux de mortalité maternelle, Cameroun 2011

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Nombre de cas		Effet de sondage (DEFF)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Taux de mortalité des adultes								
15-19	2,976	0,325	38266	38233	1,168	0,109	2,327	3,626
20-24	4,872	0,497	41825	41676	1,454	0,102	3,877	5,866
25-29	6,451	0,495	36412	36268	1,161	0,077	5,462	7,441
30-34	8,177	0,610	27835	27744	1,115	0,075	6,957	9,397
35-39	8,980	0,726	19767	19440	1,042	0,081	7,528	10,433
40-44	10,441	1,003	12668	12120	1,071	0,096	8,435	12,446
45-49	9,877	1,563	7707	7323	1,338	0,158	6,751	13,003
15-49 (standardisés par âge)	6,394	0,232	184482	182804	1,205	0,036	5,930	6,857
Quotient de mortalité adulte								
³⁵ q ₁₅ 2011	228	8	184482	182804	1,404	0,037	211	245
³⁵ q ₁₅ 2004	227	10	126031	125178	1,177	0,045	207	248
Taux de mortalité maternelle								
15-19	0,732	0,162	38266	38233	1,171	0,221	0,408	1,056
20-24	1,537	0,256	41825	41676	1,337	0,167	1,024	2,050
25-29	1,552	0,234	36412	36268	1,131	0,151	1,085	2,019
30-34	1,916	0,306	27835	27744	1,166	0,160	1,303	2,529
35-39	1,479	0,296	19767	19440	1,075	0,200	0,886	2,071
40-44	1,084	0,337	12668	12120	1,128	0,311	0,409	1,759
45-49	1,173	0,546	7707	7323	1,368	0,466	0,080	2,266
15-49 (standardisés par âge)	1,330	0,119	184482	182804	1,211	0,090	1,091	1,568
Rapport de mortalité maternelle (RMM)	782	67	184482	182804	1,211	0,086	647	916
HOMMES								
Taux de mortalité des adultes								
15-19	3,204	0,349	38178	38040	1,180	0,109	2,507	3,902
20-24	3,216	0,326	42286	42330	1,152	0,101	2,564	3,867
25-29	5,416	0,452	37391	37324	1,159	0,083	4,511	6,320
30-34	8,160	0,579	29049	28720	1,076	0,071	7,001	9,319
35-39	8,244	0,716	21001	20551	1,120	0,087	6,812	9,677
40-44	12,141	1,064	13431	12985	1,083	0,088	10,013	14,270
45-49	12,425	1,376	7743	7448	1,046	0,111	9,673	15,177
15-49 (standardisés par âge)	6,176	0,251	189080	187398	1,106	0,041	5,675	6,678
Quotient de mortalité adulte								
³⁵ q ₁₅ 2011	232	9	189080	187398	1,245	0,038	215	250
³⁵ q ₁₅ 2004	242	11	128475	127748	1,180	0,046	220	265